

2013年2月改訂（記載要領変更に伴う改訂）

この説明書は、本剤とともに  
保管し、服用の際には、よくお読みください。

鎮咳去痰薬 **せき、たん、のどの痛み**

# ビノックのどクールS

シュガーレス

第2類医薬品

本剤は、口中でゆっくり溶かして服用することにより、せきを鎮め、たんを切り、また、ぜんそく性のせきの緩和にも効果を発揮するシュガーレスタイプのドロップ剤です。

してはいけないこと



【使用上の注意】



〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〕  
本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬

相談すること



■ 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 授乳中の人 (4) 高齢者 (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (6) 高熱のある人 (7) 心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害の診断を受けた人  
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性ありますので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

**【効能・効果】**

せき、ぜんそく、たん、のどの炎  
症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・  
のどの痛み・のどのはれ

**【成分・分量】12錠中**

成 分	分量
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	37.5mg
クレゾールスルホン酸カリウム	135mg
セチルピリジニウム塩化物水和物	3mg

添加物：還元水アメ、還元麦芽糖水アメ、アセスルファムK、カンゾウエキス、アラビアゴム、カルナウバロウ、l-メントール、タルク、サラシミツロウ、シリコーン樹脂、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、繊維素グリコール酸Na、赤色102号、黄色5号、青色1号

**【用法・用量】**

右の量を口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用してください。服用間隔は2時間以上おいてください。

年 齢	1回量	服用回数
11才以上	2錠	1日6回
5才以上11才未満	1錠	
5才未満	服用しないこと	

- 定められた用法、用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

**【保管及び取扱い上の注意】**

(1) 5才未満の乳幼児の場合には、のどにつかえるおそれがありますので服用をさけてください。(2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にフタをしっかりとめて保管してください。(3) 小児の手の届かない所に保管してください。(4) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。(5) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

販売元



**新新薬品工業株式会社**

富山県富山市今市324番地  
お客様相談室 076-435-0878  
9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

**株式会社 浅田館**

東京都東村山市久米川町5-29-7

913◎3