


2013年7月改訂（記載要領変更に伴う改訂）


この説明書は、本剤とともに
保管し、服用の際には、よくお読みください。

シュガーレス〈ヨーグルト味〉


鎮咳去痰薬 **浅田飴子供せきどめドロップY**

第②類医薬品

【ご使用上の注意】

してはいけないこと 

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]
本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬

相談すること  ■ 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 授乳中の人 (4) 高齢者 (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (6) 高熱のある人 (7) 心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害の診断を受けた人 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は
服用を中止し、この説明書を持って医師、
薬剤師又は登録販売者にご相談
ください。

【効能・効果】

せき、ぜんそく、たん、のどの
 炎症による声がれ・のどのあれ・のどの
 不快感・のどの痛み・のどのはれ

【用法・用量】

次の量を口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用してください。
 服用間隔は2時間以上おいてください。

年 齢	1回量	服用回数
8才以上15才未満	2錠	1日6回
5才以上 8才未満	1錠	
5才未満	服用しないこと	

- 定められた用法、用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】12錠中

dl-メチルエフェドリン塩酸塩…… 25mg クレゾールスルホン酸カリウム…… 90mg
 セチルピリジニウム塩化物水和物… 3mg

添加物として還元水アメ、還元麦芽糖水アメ、グリチルリチン酸2K、ビタミンC、アセスルファムK、アラビ
 アゴム、カルナウバロウ、D-ソルビトール、ポリソルベート80、タルク、サラシミツロウ、シリコーン樹脂、
 ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、繊維素グリコール酸Na、青色1号、香料含有

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)5才未満の乳幼児の場合には、のどにつかえるおそれがありますので服用を
 さけてください。(2)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にフタをしっ
 かりしめて保管してください。(3)小児の手の届かない所に保管してくださ
 い。(4)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質
 が変化します)。(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

製造販売元

A株式会社 **浅田飴**

東京都東村山市久米川町5-29-7
 お問い合わせ先 03-3953-4044
 0713M1