

ぜんそく・せき・たんに  
鎮咳去痰薬気管支拡張剤  
メトキシフェナミン塩酸塩配合

# エスブロン錠Z

SS BRON® TABLETS-Z

エスブロン錠Zは、ぜんそくなどにより収縮した気管支平滑筋を拡張させ、呼吸を楽にするとともに、息苦しいせきをしずめ、のどにからんだ痰の排出をうながします。

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気があらわれることがあります。)

### 👤 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
  - (1)医師の治療を受けている人。
  - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3)高齢者。
  - (4)本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - (5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (6)次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
  - (7)次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、てんかん
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
  - (1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	動悸、排尿困難

- (2)5～6回服用しても症状がよくなる場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください  
口のかわき

## ■ 効能・効果

ぜんそく、せき、たん

## ■ 用法・用量

次の1回量を1日3回食後に服用します。

年齢	成人(15才以上)	8才~14才	5才~7才	5才未満
1回量	4錠	2錠	1錠	服用しないこと

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## ■ 成分と作用

成分	12錠中	作用
メキシフェナミン塩酸塩	50mg	気管支筋の緊張をやわらげ、気管支を拡張させて呼吸を楽にし、たんの排出をうながします。
ジプロフィリン	200mg	
ノスカピン	60mg	非麻薬性の鎮咳剤で、延髄にあるせきの中枢に作用し、せきの発生を抑えます。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	12mg	アレルギー性のせきをしずめます。

添加物として、無水ケイ酸、ゼラチン、セルロース、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、マクロゴール、アラビアゴム、カオリン、炭酸Ca、硫酸Ca、カルナウバロウ、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、トウモロコシデンプン、バレイショデンプン、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート含有します。

## ■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にビンのフタをよくしめて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)本剤をぬれた手で扱わないでください。ぬれた手で扱っていると、糖衣にムラができたり、変色したりすることがあります。
- (5)ビンの中のつめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (6)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

## ■ お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-028-193

受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)



製造販売元

**エスエス製薬株式会社**

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4