

この説明文書は服用前に必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮咳去痰薬

第②類医薬品

# 小児用 ビタコールせき止めシロップ

せきは、のどや気管支の病気にもなっておこります。せきが長く続きますと肺や心臓に負担がかかり、体力も消耗しますので早期に手当てをすることが必要です。小児用ビタコールせき止めシロップは、お子様が服用しやすいシロップ剤です。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと  
(眠気があらわれることがある。)
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
4. 過量服用・長期連用しないこと

### 🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (6) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
  - (7) 次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

(2)5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること  
便秘、口のかわき

○本剤は小児用ですが、鎮咳去痰薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。

## 効 能

せき、たん

## 用法・用量

年齢	1回量	1日服用回数
8才～10才	10mL	1日3回食後および必要な場合には就寝前に服用して下さい。また、約4時間の間隔をおいていただければ1日6回まで服用できます。 (添付の目盛付コップではかり服用して下さい。)
5才～7才	6mL	
3才～4才	5mL	
1才～2才	4mL	
3ヵ月～11ヵ月	2mL	
3ヵ月末満	服用しないで下さい。	

### <用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守して下さい。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (3)2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむをえない場合にのみ服用させて下さい。
- (4)本剤は生薬エキスを含有していますので、まれに沈澱を生じることがありますが効果には影響ありません。よく振ってから服用して下さい。

## 成分・分量

成分名	分量(60mL中)	作用
リン酸ジヒドロコデイン	15mg	せき中枢に作用して、せきをしずめます。
グアイフェネシン	150mg	気道粘膜の分泌を促進して、粘稠なたんをうすめて出しやすくします。
無水カフェイン	30mg	眠気を防ぎます。
dl-塩酸 メチルエフェドリン	37.5mg	気管支を拡張して、せきをやわらげ、 たんの排出を助けます。
マレイン酸 クロルフェニラミン	6mg	抗ヒスタミン剤。アレルギー性のせきに効果があります。
キキョウ流エキス	0.6mL (キキョウ600mgに相当)	サポニン系の去痰生薬です。気道の分泌物を増加させるとともに、繊毛運動を活発にしてたんの排泄を助けます。

添加物：白糖、エタノール、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、香料、プロピレングリコール

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)服用後は、ピンのフタをよくしめて下さい。しめ方が悪いと内容液がもれたり、汚染したりすることがありますので注意して下さい。
- (5)添付の目盛付コップはご使用のつと、水洗いなどして常に清潔に保管して下さい。
- (6)使用期限をすぎた製品は服用しないで下さい。



### 製品のお問い合わせ先

小林薬品工業株式会社 お客様相談室  
電話 058(278)3933  
受付時間 10時～16時(土、日、祝日を除く)

### 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元

**小林薬品工業株式会社**

岐阜県岐阜市中鷲1丁目139番地

本社所在地

東京都中央区日本橋霜崎町40番6号