

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮咳去痰薬

第2類医薬品

せき・たんでつらい時に

ルル®せき止めミニカプセル

ルルせき止めミニカプセルの特徴

1. 大きいカプセルが苦手な方にも服用しやすい小粒のソフトカプセルです。
2. 中枢性の非麻薬性鎮咳成分・デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物がつらい咳をしずめます。
3. リゾチーム塩酸塩が粘稠なたんを分解して、排出しやすくします。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい。
本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 授乳中の人
 - (4) 高齢者
 - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (6) 次の症状のある人
高熱
 - (7) 次の診断を受けた人
心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息苦しさ、息切れ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。




3. 5~6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

■ 効能・効果

せき・たん

■ 用法・用量

次の量を水又はお湯で服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	2カプセル  	3回：4時間以上の間隔をおいて服用して下さい。
8歳以上15歳未満	1カプセル 	
8歳未満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守して下さい。
- (2)8歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (3) (カプセル剤の取り出し方)
右図のようにカプセル剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲み下さい。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



■ 成分・分量

本剤は、6カプセル中に次の成分を含有しています。

成分	分量	はたらき
デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物	60mg	せき中枢に作用し、せきをしずめます。
ノスカピン	60mg	
リゾチーム塩酸塩	60mg (カプ)	たんを分解して排出しやすくします。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支を広げ、せきをしずめます。
無水カフェイン	90mg	眠気防止作用を有します。

添加物：ポリソルベート80、グリセリン脂肪酸エステル、サラシミツロウ、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ゼラチン、グリセリン、酸化チタン

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(カプセルが光や温度、湿気により変色したり軟らかくなることがあります)
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電話 03 (5205) 8331

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ルルについて詳しくは www.lulu.jp

07 登録商標

 販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋3-14-10

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

製造販売元
東亜薬品株式会社
富山県富山市水橋開発277番10