

2011年4月下線部改訂

この説明書は、ご使用の前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鎮咳去痰薬

コデリン 第②類医薬品

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気があらわれることがあります)

3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

4. 過量服用・長期連用しないでください

👤 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。

(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。

(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(6) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難

(7) 次の診断を受けた人。

心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

便秘、□のかわき

(裏面もお読みください。)

効能・効果
せき、たん

用法・用量

次の量を、食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	1包	3回
11才以上15才未満	2/3包	
8才以上11才未満	1/2包	
5才以上 8才未満	1/3包	
3才以上 5才未満	1/4包	
3才未満	服用させないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量 3包(成人1日量)中

成 分	分 量
シヒドロコデインリン酸塩	30mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg
グアヤコールスルホン酸カリウム	270mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg

添加物としてリン酸水素Ca、パレイショデンプン、セルロース、乳糖、赤色102号を含有します。(1包：1g)

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)表示の期限を過ぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先

くすり相談窓口：(076)435-5055
午前9時から午後4時30分まで
(土、日、祝日を除く)

発売元 **中部薬品株式会社**
富山県射水市戸破69-12

製造販売元 **第一薬品工業株式会社**
富山市草島15-1