

第②類医薬品

この添付文書は本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

鎮咳去痰薬 **コルゲン_{ユーフ}せき止め液**

せきは、気管、気管支に炎症があったり、刺激性ガスを吸入したりすると、それが刺激となって起こります。また、気管支内に多量の粘液や分泌物などがたまり、咯出（はきだし）することが難しい場合に起こります。せきが長く続くと睡眠や食欲をさまたげ、体力は消耗し、ひいては病気に対する抵抗力が低下します。

コルゲンユーフせき止め液には、せきをしずめる成分とたんを除去する成分が配合されており、たんがからんだせきにも効果をあらわします。このほか、生薬成分も配合されています。

⚠ 使用上の注意**❌ してはいけないこと**

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください

本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

（眠気等があらわれることがあります。）

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

5. 過量服用・長期連用しないでください

**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 乳児（乳児において、本剤に含まれるリゾチーム塩酸塩を初めて服用した時に、ショック（アナフィラキシー）があらわれたとの報告があります。）。

(4) 高齢者。

(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(6) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難

(7) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック（アナフィラキシー）	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

せき、たん

用法・用量

次の1回量を1日3回毎食後及び必要な場合には、就寝前に服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
15歳以上	10mL	3 回 場合によっては、1 日 6 回まで約 4 時間の間隔を置いて服用してください。
11歳以上15歳未満	6 mL	
8 歳以上11歳未満	5 mL	
5 歳以上 8 歳未満	3 mL	
1 歳以上 5 歳未満	2 mL	
3 ヶ月以上 1 歳未満	1 mL	
3 ヶ月未満の乳児	服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)12歳未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先してください。

成分・分量(10mL中)

成分・分量	働 き
リゾチーム塩酸塩 10mg(力価)	たんの粘性成分を分解し、たん切れをよくして喀出しやすくさせます。
ジヒドロコデインリン酸塩 5mg	せきの中枢に作用して、せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩 12.5mg	気管支を拡張して呼吸を楽にし、せきをしずめます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩 2mg	ヒスタミンの作用を抑えて、せきをしずめます。
グアヤコールスルホン酸カリウム 45mg	気道の分泌液量を増やし、たんをうすめて喀出しやすくさせます。
セネガ流エキス(セネガとして0.2g) 0.2mL	

〔添加物〕白糖、DL-リンゴ酸、安息香酸、パラベン、エタノール、クエン酸Na、香料

＜成分・分量に関連する注意＞

本剤の服用により、糖尿病の検査値に影響を及ぼすことがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)服用のつど、ビンの口の周囲をよくふいてからキャップをしっかりとめてください。
- (5)本剤に添加されている甘味成分がキャップに付着しやすいため、キャップが開かなくなる場合がありますが、このような場合は一度キャップ部を温湯に浸してから開けるようにしてください。
- (6)計量カップは、使用のつど水洗いなどして、常に清潔に保管してください。
- (7)使用期限(外箱及びラベルに記載)をすぎた製品は服用しないでください。

本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
電話受付時間:月～金(祝日を除く)9:00～17:00



発売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14



製造販売元 大昭製薬株式会社 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168