

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

鎮咳去痰薬

第2類医薬品

ジージーコデイン[®] 糖衣錠

せきは、気道の表面にいろいろな刺激が加わることによって起こり、ただ苦しいばかりでなく、安眠を妨げて体力を著しく消耗させ、全身を衰弱させるために、病気の治りをおくらせたり、こじらせたりします。

あなたは、しばしばせきと共に発現する不快な症状で、せきをひどくしますので、せきとたんは同時に抑えるのが理想的です。

「ジージーコデイン糖衣錠」は、苦しいせきをすみやかにしずめる成分と、不快なたんを排出しやすくする成分を組み合わせた、鎮咳去痰薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがある)
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
4. 過量服用・長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 1) 医師の治療を受けている人
 - 2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 3) 高齢者
 - 4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 5) 次の症状のある人
高熱
 - 6) 次の診断を受けた人
心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症 状
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果
せき、たん

用法・用量
下記の量を毎食後に服用してください

年 齢	1 回服用量	1 日服用回数
成人 (15才以上)	4 錠	3 回
11才以上15才未満	3 錠	
8 才以上11才未満	2 錠	
8 才未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守してください
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください
- (3)12才未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先してください
- (4)錠剤の取り出し方

図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



成分・分量

成人1日量 (12錠) 中に次の成分を含んでいます

成 分	含 量	はたらき
グアイフェネシン	264mg	気管支の分泌液を増加させて粘性のたんをうすめ、排出しやすくします
ジヒドロコデインリン酸塩	15mg	延髄にあるせきの中樞に作用してせきをしずめるすぐれた作用があります
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支筋の緊張をほぐし、せきをすみやかにしずめます
カンゾウ粗エキス	180mg (原生薬として900mg)	主成分であるサポニンは、たんを排出を促し、甘味成分はのどの刺激をやわらげてせきをしずめます
セネガエキス	180mg (原生薬として594mg)	気道の分泌液を増加させ、たんが排泄しやすいようにうすめます

添加物として、乳糖、タルク、炭酸Ca、トウモロコシデンプン、ゼラチン、ミツロウ、セルロース、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、白糖、アラビアゴム、酸化チタン、カルナウバロウ、パラフィンを含んでいます

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
- (2)小児の手の届かない所に保管してください
- (3)他の容器に入れ替えないでください (誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください

本製品についてのお問合せ先

- ・お買い求めのお店
- ・日邦薬品工業株式会社 学術情報室
住 所：〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-46-16
電 話：(03)3370-7174 (代表)
受付時間：午前9：00から午後5：00まで (土、日、祝日を除く)

発 売 元  **日邦薬品工業株式会社**
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元  **日東薬品工業株式会社**
京都府向日市上植野町南開35-3