

この説明文書はお薬とともに保管し、使用の際にはよくお読みください。

©

説明文書改訂年月
2019年1月
※（用法・用量の改訂）

第②類医薬品

鎮咳去痰薬

新ガン[®]せき止め錠



使用上の注意

してはいけないこと



（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
（眠気等があらわれることがある。）
3. 授乳中の人は本剤を服用しないが、本剤を服用する場合は授乳を避けること
4. 過量服用・長期連用しないこと

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
(6) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、てんかん、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
循環器	動悸
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

裏面もお読みください。

成分・分量、はたらき

新ガノンせき止め錠は9錠(成人1日量)中、次の成分を含みます。

薬効別	成分名	分量	主なはたらき
中枢性鎮咳剤	ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	咳の中枢に働いて、咳をしずめます。
気管支拡張剤	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	52mg	気管支をひろげ、咳をしずめます。
	シブロフィリン	90mg	気管支平滑筋を弛緩させて、咳をしずめます。
抗ヒスタミン剤	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg	アレルギー症状を改善します。

添加物として乳糖水和物、セルロース、カルメロースNa、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、タルク、ヒプロメロースを含有します。

効能・効果

せき、たん

※ 用法・用量

年齢	1回量	用法(1日服用回数)
成人(15歳以上)	3錠	1日3回食後に服用してください。
12歳以上15歳未満	2錠	
12歳未満		服用させないでください。

<用法及び用量に関連する注意>

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) ピンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気などの影響で薬が変質することがあるので、服用のつどフタをよくしめること。
- (5) 使用期限をすぎた製品は使用しないこと。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

発売元：天野商事株式会社 お客様相談室

電話：(052)951-2340

受付時間：9:00~17:00(土、日、祝日、特定休日を除く)

製造販売元：明治薬品株式会社 お客様相談室

電話：(03)3253-3451

受付時間：9:00~17:00(土、日、祝日、特定休日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



発売元

天野商事株式会社

名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

製造販売元

明治薬品株式会社

富山県富山市三郷6番地