

この説明書は本剤とともに保管し、  
服用に際しては必ずお読み下さい。

鎮咳去痰薬

# コールトップB

せきはそのどや気管支の炎症などによって起こります。激しいせき、長引くせきは睡眠をさまたげ、体力を消耗させるため、しばしば病気の回復を遅らせます。

コールトップBは、せきをしずめる成分、たんを出やすくする成分が配合されていますので、苦しいせきを効果的にしずめます。

## ⚠️ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい

(眠気があらわれることがあります。)

### 🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。



高熱、排尿困難

(8) 次の診断を受けた人。

心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい

便秘、口のかわき

## 成分と作用

本 品	1日量 (9錠) 中	作 用
リン酸ジヒドロコデイン	22mg	せき中枢に直接はたらいて、せきをしずめます。
dℓ-塩酸メチルエフェドリン	50mg	収縮した気管をひろげ呼吸を楽にし、せきをしずめます。
マレイン酸クロルフェニラミン	8mg	アレルギー性のせきに効果をあらわします。
無水カフェイン	90mg	大脳皮質に作用して、ねむけを防ぎます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	180mg	気道の分泌を促進し、たんの粘度を下げ、たんを出やすくして呼吸を楽にします。
セネガ末	180mg	
キキョウ末	240mg	
車前草軟桐エキス (原生薬として)	160mg (1040mg)	

添加物としてポリビニルピロリドンK30、ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン、乳糖、天然ケイ酸アルミニウム、タルク、ステアリン酸マグネシウム、ヒドロキシプロピルメチルセルロース2910、沈降炭酸カルシウム、カオリン、アラビアゴム末、ゼラチン、白糖、酸化チタン、カルナウパロウ、ミツロウ、パラフィンを含有します。

## 効能又は効果

せき、たん

## 用法及び用量

次の1回量を1日3回、食後服用して下さい。

年 齢	大人 (15才以上)	8才以上15才未満	5才以上 8才未満	5才未満
1回量	3錠	2錠	1錠	服用しないこと

### <用法及び用量に関連する注意>

- (1) 用法及び用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

### ■お問い合わせ先.

伊丹製薬株式会社 お客様相談室 TEL 0740-22-2059

受付時間：9時から16時30分まで(土、日、祝日を除く)



製造販売元

伊丹製薬株式会社

滋賀県高島市今津町下弘部280