

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要なときに読めるように大切に保管して下さい。

## せき、たん オフセキン®せきどめ顆粒

発作的におこる激しいせきや、のどにからまるたんは、とても苦しくつらいもの。  
オフセキンせきどめ顆粒は、せきをしずめる成分、たんをとり去る成分を効果的に  
配合した服用しやすい顆粒剤です。

### ⚠ 使用上のご注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないで下さい。  
本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、  
乗物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬。
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。  
(眠気があらわれることがあります。)



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 授乳中の人。
  - (4) 高齢者。
  - (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (7) 次の症状のある人。高熱、排尿困難。
  - (8) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に  
相談して下さい。
  - (1) 服用後、次の症状が現れた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診  
療を受けて下さい。






症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色 が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあ らわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症 状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。

- (2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が  
見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。  
便秘、口のかわき

## 効能・効果

せき、たん

## 用法・用量

年齢区分	15才以上	11～14才	8～10才	5～7才	3～4才
1回量					
	1包	2/3包	1/2包	1/3包	1/4包

上記1回量を、1日3回食後に服用して下さい。  
服用間隔は、4時間以上おいて下さい。

- お子さまに服用させる場合には保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- 用法・用量をお守り下さい。
- 3才未満のお子さまには服用させないで下さい。

## 成分・分量

本品1日量(3包)中

1包量1g

成分	分量	作用
リゾチーム塩酸塩	60mg(力価)	卵白より抽出した消炎酵素物質で、炎症を抑え、痰の喀出を容易にします。
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	中枢神経に作用してせきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支を広げる作用があります。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	アレルギーによるせきに効果があります。

添加物として乳糖水和物、D-マンニトール、バレイシヨデンブ、サッカリンナトリウム水和物、香料を含有します。

## 保管・取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) お子さまの手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。  
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- (5) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。

## 消費者ご相談窓口

本剤をご使用になり、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきます様お願い申し上げます。

消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 0120-468771

受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00(土、日、祝日を除く)

発売元 **協和薬品工業株式会社**  
営業本部：岐阜県岐阜市野一色2丁目8番6号  
本社：東京都世田谷区上祖師谷1丁目11番3号

製造販売元 **株式会社 廣昌堂**  
富山県射水市水戸田2841