

鎮咳祛痰剤 ポリコデン錠 第2類医薬品**⚠ 使用上の注意****☒ してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

**1.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください**

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

**2.服用後、乗物又は機械類の運転操作をし****ないでください**

(眠気等があらわれることがあります。)

**3.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください****4.過量服用・長期連用しないでください****相談すること****1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害

**2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください****関係部位 症状**

皮膚 発疹・発赤、かゆみ

消化器 吐き気・嘔吐、食欲不振

精神神経系 めまい

泌尿器 排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

**3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

便秘、口のかわき、眠気

**4.5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

## ■機能・効果

たん、せき

## ■用法・用量

次の量を1日3回、食後に服用してください。

年齢	1回量	服用回数
大人（15歳以上）	4錠	
11歳以上15歳未満	2.5錠	
8歳以上11歳未満	2錠	
5歳以上8歳未満	1錠	
5歳未満の幼児		服用しないこと

〈用法及び用量に関連する注意〉

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(2) 定められた用法、用量を厳守してください。

(3) 右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。  
(誤ってそのまま飲みこんだりすると食道粘膜に突き刺さる等、思わぬ事故につながることがあります。)



(PTPシートの取り出し図)

## ■成分・作用

成 分	12錠中	作 用
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せき中枢にはたらいて、せきをしのぎます
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支を拡げ、呼吸を楽にし、せきをしのぎます
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり等のアレルギー症状をおさえます
添加物としてメタケイ酸アルミン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、セルロース、乳糖、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、赤色102号を含有します。		

## ■保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)

(4) 配置期限(外装に記載)をすぎた製品は服用しないでください。

## ■お問い合わせ先

本剤につきましてのお問い合わせは、下記にお願いいたします。

新新薬品工業株式会社 お客様相談室

TEL: (076) 435-1166 (代)

受付時間:午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 新新薬品工業株式会社  
〒930-2221 富山県富山市今市324番地