

服用に当たって、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鎮咳去痰薬

ピロソA

医薬品

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬、塩酸フェニルプロパノールアミンを含有する鼻炎用内服薬

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気があらわれることがあります。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。

高熱、排尿困難

(8) 次の診断を受けた人。

心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

便秘、口のかわき

〔効能又は効果〕

せき、たん。

〔用法及び用量〕

次の量を、食後、服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
15歳以上	3 錠	3 回
11歳以上15歳未満	2 錠	
11歳未満	服用しないこと	

(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(2)錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。

〈PTPシートの取り出し図〉



(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)

〔成分及び分量〕

9 錠中

ジヒドロコデインリン酸塩……………15mg

dl-メチルエフェドリン塩酸塩 ……75mg

クロルフェニラミンマレイン酸塩……………12mg

グアヤコールスルホン酸カリウム ……270mg

セネガ乾燥エキス……………25mg

(原生薬換算量417.5mgに相当す)

添加物として乳糖、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、ステアリン酸Mg、セラック、白糖、ゼラチン、アラビアゴム末、炭酸Ca、酸化チタン、サラシミツロウ、カルナウバロウを含有する。

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(4)期限をすぎた製品は服用しないでください。



お客様相談窓口 TEL 076-476-1111

9:00~16:30 (土、日、祝祭日は除きます。)



製造販売元

明治製薬株式会社

富山県滑川市中川原 77