



ご使用前にこの添付文書を必ずお読みください。
また、必要時にそなえて大切に保管してください。



第②類医薬品



のどの痛みを伴うせき・たん

皇漢堂せき止め錠

プロムヘキシン塩酸塩、トラネキサム酸配合

せきが長く続くと、睡眠や食欲の妨げとなり体力を消耗し、いろいろな病気を誘発する原因にもなりかねません。せきが出はじめたら、大事に至らないよう早めの適切な治療が大切です。

皇漢堂せき止め錠は、せきをしずめる成分に、のどのはれや痛みを抑えるトラネキサム酸、たんを出しやすくするプロムヘキシン塩酸塩をバランスよく配合したフィルムコーティング錠です。



△[使用上の注意]

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください。
本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬）、鎮静薬、トラネキサム酸を含有する内服薬
- 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください。
(眠気があらわれることがあります)
- 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
- 過量服用・長期連用しないでください。

相談すること

- 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください。
 - 医師または歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 本人または家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(6) 次の症状のある人。

高熱

(7) 次の診断を受けた人。

心臓病、高血圧、糖尿病、腎臓病、甲状腺機能障害、血栓のある人
(脳血栓、心筋梗塞、血栓性静脈炎)、血栓症を起こすおそれのある人

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師または薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 心	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振、胸やけ、胃部不快感、腹痛
精 神 神 経 系	めまい、頭痛
そ の 他	血たん

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。

便秘、下痢

[成分と作用]

1日量(9錠)中

成 分	含量 (9錠中)	作 用
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支を広げ、せきをしずめてたんを出しやすくします。
ノスカピン	60mg	せきをしずめます。
プロムヘキシン塩酸塩	12mg	たんを出しやすくします。
トラネキサム酸	420mg	のどの痛みを和げます。

添加物として、乳糖水和物、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、ハッカ油、銅クロロフィリンナトリウム、カルナウバロウ、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

[効能・効果]

のどの痛みを伴うせき・たん

[用法・用量]


次の1回量を1日3回毎食後に、水またはお湯でかまずに服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	3錠	3回
11歳以上15歳未満	2錠	
6歳以上11歳未満	1錠	
6歳未満の乳幼児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



[保管および取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れかえないでください。
- (4) 箱の「開封年月日」記入欄に、内袋（アルミ袋）を開封した日付を記入し、この文書とともに箱に入れたまま保管してください。
- (5) 一度内袋（アルミ袋）を開封した後は、品質保持の点から2ヵ月以内に服用してください。なお、使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのご相談は、お客様相談窓口までお願い致します。

お客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-023520

受付時間 平日9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

兵庫県尼崎市長洲本通2丁目8番27号

皇漢堂製薬株式会社

(10.08.改訂)