

## 鎮咳去痰薬

新 **ブクエフ錠**

せきは安静や睡眠をさまたげ、体力を激しく消耗しますので、余病の併発につながります。  
したがって、せきは軽いうちに、はやく取り除くことが大切です。

## ⚠️ 使用上の注意

## ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい  
(眠気があらわれることがあります。)
3. 過量服用、長期連用しないで下さい\*
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい\*



## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (6) 次の症状のある人。  
高熱、むくみ、排尿困難
  - (7) 次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、糖尿病、腎臓病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精 神 神 経 系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい  
便秘、口のかわき

## 適応症

せき、たん

## 用法・用量

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
15歳以上	3錠	3回服用して下さい。 但し、服用間隔は4時間 以上おいて下さい。
11歳以上15歳未満	2錠	
5歳以上11歳未満	1錠	
5歳未満	服用しないで下さい	

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。  
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。  
(3) 錠剤の取り出し方。

図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



組成 1日量9錠中に次の成分を含んでいます。

成 分	9錠中
リン酸ジヒドロコデイン	24mg
d,l-塩酸メチルエフェドリン	52.5mg
マレイン酸クロルフェニラミン	9mg
グアヤコールスルホン酸カリウム	210mg
無水カフェイン	90mg
オウヒエキス (オウヒ3gに相当)	300mg
ニンジンエキス (ニンジン990mgに相当)	90mg
カンゾウエキス (カンゾウ1.2gに相当)	300mg
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	1000mg

添加物：バレイショデンブ、カルメロースCa、ステアリン酸Mg

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。  
(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。  
(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)  
(4) 配置期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先  
田村薬品工業株式会社 お客様相談室  
0745-66-2636  
受付時間10:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元

**田村薬品工業株式会社**  
奈良県御所市西寺田50