

第3類医薬品

22錠

✂ ここからお切りください。開封後はチャックを閉じて保管してください。

南天のど飴ML(せき止め薬)

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。
必要ときに読めるように、大切に保管してください。

使用上の注意【してはいけないこと】(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります) 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください/他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など) 【相談すること】 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 次の症状のある人。高熱 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください 3. 5〜6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください **効能・効果** せき、のどの炎症による声がれ、のどのあれ、のどの不快感、のどの痛み、のどのほれ **用法・用量** 食前に服用してください。左表の1回量を1錠ずつ口に含み、がまぐずにゆっくり溶かしてください。なお、1回分を服用後は、2時間以上の間隔をおいて服用してください。＜用法・用量に関連する注意＞(1)用法・用量を厳守してください。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	3錠	3回
8才以上15才未満	2錠	
5才以上8才未満	1錠	
5才未満	服用しないでください。	

成分・分量 1日量(9錠)中 南天実乾燥エキス500mg 添加物:黒砂糖、白糖、水アメル、メントール、アラビアゴム、カラメル、タルク、カルナウバロウ、赤色3号、青色1号、黄色5号、香料(エチルバニリン) **保管および取扱い上の注意** (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)品質を保持するため、開封後はチャックを閉じて保管してください。(4)期限を過ぎた製品は服用しないでください。

1錠あたり7kcal



4987156 21237 1

使用
期限
製造
番号

製造販売元

常盤薬品工業株式会社
大阪市中央区安土町3-5-12
NOEVIR GROUP

南天のど飴のブランドサイトはこちら
<http://nodoame.jp>

お問い合わせは

常盤薬品工業株式会社
お客さま相談室0120-875-710まで
受付時間 9:00〜17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度
0120-149-931



PE,金属

067325
TISC801