

この説明文書は、お薬とともに保管し、ご使用の際には、よくお読みください。

口中洗淨・うがい薬
アストリンゴゾール
のどの炎症と痛みに

Astring-o-sol®
MOUTHWASH GARGLE

アストリンゴゾールは、**うすめて使う**うがい薬です。
のどや口の中に炎症や痛みがあるとき、アストリンゴゾールで
うがいをしますと、炎症や痛みがやわらぎます。
また、うがいをしたあと、口の中に爽快な感じがえられます。

アストリンゴゾールは、次のようなときに使用してください

- かぜでのどに炎症があるとき、アストリンゴゾールでうがいをしますと、炎症や痛みがやわらぎます。
- 口の中に炎症があるとき、アストリンゴゾールでうがいをしてください。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

次の症状のある人。

口内のひどいただれ

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
口	刺激感

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能】

咽喉炎、口内炎の口中洗淨
口腔、咽喉の含嗽洗淨

【用法・用量】

●口中・のどに炎症のある場合

本品の約5mL(茶さじ1杯)を約45mL(コップ1/4杯)のぬるま湯に加えて、よくかきまぜ、うがいをするか、または口中をゆすいでください。1日3～4回行ってください。

●口中・のどの洗浄

本品の約2.5mL(茶さじ1/2杯)を約45mL(コップ1/4杯)の水に加えて、よくかきまぜ、うがいをするか、または口中をよくゆすいでください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)うがい用にのみ使用してください。

【成分】(100mL中)

サリチル酸メチル …………… 4.615g

添加物としてミルラ流エキス、塩化亜鉛、無水クエン酸、エタノールを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)火気に近付けないでください。
- (5)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

【お問い合わせ先】

- (1)購入した薬局・薬店
- (2)グラクソ・スミスクライン株式会社
コンシューマーヘルスケア事業本部 お客様相談室
【電話】03-5786-6315
【受付時間】9:00～17:00(土、日、祝日を除く)
- (3)上記以外の時間で、誤飲、誤用、過量使用等の緊急のお問い合わせは下記機関もご利用いただけます。
連絡先：(財)日本中毒情報センター 中毒110番
電話：072-727-2499(24時間対応)

発売元：グラクソ・スミスクライン株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目6番15号

製造販売元：山田製薬株式会社 東京都墨田区東駒形1丁目14番1号