



第2類
医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



内服痔疾用薬

塩化リゾチーム配合

内服用 リナロン[®]

内服用リナロンは…

- いぼ痔、痔の出血、きれ痔などに効果のある長円型で黄かっ色のフィルムコート錠です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。



下痢

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、悪心・嘔吐、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください

下痢

〔効 能〕

いぼ痔、かゆみ痔、きれ痔、痔の出血、痔の疼痛

〔用法・用量〕

1回1～2錠、1日2回服用します。

〈用法・用量に関連する注意〉

定められた用法・用量を厳守してください。

〔成分・分量と働き〕2錠中

成 分	分 量	働 き
塩化リゾチーム	40mg	炎症を抑え、痛み、はれをとります。また、出血を止める働きもあります。
カルバゾクロム	2mg	痔の出血に効果があります。
ビタミンB ₂	6mg	痔疾患部の粘膜を正常な状態にする働きがあります。
乙字湯乾燥エキス	375mg	炎症を鎮め、熱感をとリ、血行をよくする働きがあります。
酢酸トコフェロール	50mg	血行をよくする働きがあり、痔の回復に効果があります。
セイヨウトチノミエキス	60mg	セイヨウトチノキ(マロニエ)の種子より抽出したエキスで、肛門部の静脈の血行をよくし、うっ血(血がとどこおること)を改善する働きがあります。

添加物として、乳糖、セルロース、バレイショデンプン、CMC-Ca、メタケイ酸アルミン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、酸化チタン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、黄色5号を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤はビタミンB₂を含有するため、本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



◎早くよくなっていただくためのアドバイス

肛門の周囲には細い静脈が網の目のように入り組んでいます。この静脈の血液の流れが悪くなると、うっ血(血がとどこおること)やはれが起こります。また、排便などの刺激で出血、痛み、かゆみなどを起こします。

1. 硬い便は肛門に傷をつけたり、出血や脱肛の原因となりますから、食事に注意し、便秘にならないように心がけてください。
2. ぬれたガーゼで拭く、こまめに入浴をするなど、患部を常に清潔に保つように心がけてください。
3. 座る、かがむなど患部にうっ血を起こしやすい姿勢を長く続けないでください。
4. お酒や香辛料の入った食べ物、タバコなどの刺激の強いものはなるべくさけるようにしてください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-831(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間: 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号