

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

痔の痛み・出血・はれ・かゆみに

プリザエース注入軟膏

第2類医薬品

〈痔疾用外用薬〉

◆プリザエース注入軟膏は、肛門内側(肛門奥)の痔には注入、肛門外側の痔には塗布と、痔の部位や症状によって2通りの使用方法が選べる便利な痔疾用薬です。
◆患部や薬剤に直接手を触れず、衛生的に注入できます。また、1個ずつ包装されているので携帯にも便利です。



使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- ① 次の人は使用しないでください
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 患部が化膿している人。
- ② 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- ③ 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります)
- ④ 長期連用しないでください



相談すること

- ① 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 次の症状のある人。
排尿困難
(5) 次の診断を受けた人。
緑内障
- ② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
泌尿器	排尿困難
その他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- ③ 使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、眠気
- ④ 10日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能

- (注入時)：きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和
(塗布時)：きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒


用法・用量

〔注入する場合〕

- 容器先端部を肛門部に挿入し、全量を注入してください。

年齢	15才以上	15才未満
1回量	1個	使用しないこと
使用回数	1日1~3回	×

- ①キャップをとり、すべりを良くするため軟膏を少し出します。
- ②容器先端部を肛門内に挿入し、容器を押して薬剤を注入してください。(押したままの状態でき引き抜いてください)



〔塗布する場合〕

- 次の量を肛門部に塗布してください。なお、一度塗布に使用したものは、注入には使用しないでください。

年齢	15才以上	15才未満
1回量	適量	使用しないこと
使用回数	1日1~3回	×

キャップをとり、軟膏をそのまま塗るか、ガーゼなどにのばして患部にあててください。



- ※軟膏が硬くて出しにくい場合は、手で握ってあたためると軟らかくなります。
- ※注入式のため、容器の中に薬剤が少量残りますが、残量を見込んで充填しています。

〔注意〕

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児には使用させないでください。
- (3)肛門部にのみ使用してください。
- (4)肛門内に注入する場合、容器先端部分のみを挿入してください。

成分

1個(2g)中

成分	分量	はたらき
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	5mg	患部の出血・はれをおさえます。
塩酸テトラヒドロソリン	1mg	
リドカイン	60mg	患部の痛み、かゆみをおさえます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	4mg	患部のかゆみをしずめます。

成分	分量	はたらき
クロルヘキシジン塩酸塩	5mg	細菌の感染をおさえ、傷口の悪化を防ぎます。
トコフェロール酢酸エステル	60mg	血管を強くし、出血を防ぎます。
アラントイン	20mg	傷口の治りをはやめます。

添加物：流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、サラシミツロウ、カルボキシビニルポリマー、オリーブ油、ワセリン

保管及び取扱い上の注意


- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。(品質保持のため)
- (5)使用済みの容器等は、トイレに流さないでください。

症状別の効果的な使用法

【痔の症状】

【注入軟膏の使用法】

肛門内側(肛門奥)の
いぼ痔のはれ・出血等




注入
肛門内に薬剤を注入する。




※1回の使用で全量を注入してください。

肛門外側の
いぼ痔のはれやきれ痔の出血等



塗布
肛門外側に薬剤を塗布する。



※一度塗布に使用したものは、注入には使用しないでください。

治療のポイント



排便後は入浴するか、ぬるま湯で洗う等、肛門を常に清潔にしましょう。また、入浴は患部の血行を改善するので、毎日入浴う心がけましょう。



便秘や下痢をしないよう心がけましょう。特に便秘の時には、煮た野菜や海藻類・果物等を多く食べ、便通を整えましょう。



アルコール類、刺激物(からし、わさび等)を多くとると、症状を悪化させることがあるので、なるべくひかえましょう。



すわり続ける等、同じ姿勢を長く続けると、肛門部がうっ血するため、症状を悪化させやすいので、時々体操や散歩等をして、体を動かしましょう。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いいたします。



連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室
電話 03-3985-1800
受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

発売元
大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>
製造販売元
株式会社 雪の元 本店
奈良県橿原市大谷町182番地

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)