

この添付文書は、お薬とともに保管し、使用の際には、よくお読み下さい。

添付文書改訂年月  
2009年5月

①

第②類医薬品

痔の痛み・出血・はれ・かゆみに  
**ヘロキスA痔軟膏**  
(痔疾用剤)

ヘロキスA痔軟膏は、患部の急激な炎症を抑えるプレドニゾロン酢酸エステルやすばやく痛みを抑え持続性のあるリドカイン、止血作用のあるdl-メチルエフェドリン塩酸塩、傷の治りを早めるアラントイン、殺菌消毒剤のクロルヘキシジン塩酸塩など5つの有効成分の働きにより、痔による痛み・出血・はれ・かゆみの症状にすぐれた効果をあらわします。

**⚠ 使用上の注意**

**⊗ してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと  
患部が化膿している人。
2. 長期連用しないこと

**Ⓜ 相談すること**

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。  
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること  
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位  | 症 状          |
|-------|--------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |
| そ の 他 | 刺激感、化膿       |

- (2) 10日間位使用しても症状がよくならない場合

**成分・分量** 1g中

プレドニゾロン酢酸エステル……………0.5mg  
リドカイン……………30.0mg  
dl-メチルエフェドリン塩酸塩……………5.0mg  
アラントイン……………10.0mg  
クロルヘキシジン塩酸塩……………2.5mg

添加物としてセバシン酸ジエチル、ミリスチン酸イソプロピル、プロピレングリコール、マクロゴール、ワセリンを含有します。

**【特 徴】**

- ・主薬のプレドニゾロン酢酸エステルが急激な炎症を抑え、リドカインなど4つの有効成分が、痔による痛み・出血・はれ・かゆみにすぐれた治療効果を発揮します。
- ・本品は、白色の軟膏で、使用感にすぐれています。
- ・急性疾患は勿論慢性化した症状にも効果を発揮します。

**効能・効果**

きれ痔（さけ痔）・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒

(裏面もお読み下さい)

## 用法・用量

適量をとり、肛門部に塗布してください。なお、1日3回まで使用できます。

### 〔用法及び用量に関連する注意〕


- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 肛門部にのみ使用すること。

### 〔痔のなおりをはやめるために〕

- ・食事：便通を整えるため、野菜・果物・海産物を適度に摂ってください。アルコールはよくありません。
- ・入浴：血行を良くすることにより、うっ血を取り去り、患部を清浄にしますので効果的です。
- ・排便：無理にいきまないようにし、排便後は肛門を清潔にしましょう。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は使用しないで下さい。
- (5) 一度フタをあけた後は、使用期限内でも、なるべく長期間の使用はしないで下さい。



本製品内容についてのお問合せ

①お買上げのお店


②お客様相談室：明治薬品株式会社

電 話：03-3253-3451

受 付 時 間：9:00～17:00（土、日、祝日、特定休日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元

 **明治薬品株式会社**  
富山県富山市三郷6番地