

痔の痛み・かゆみ・はれ・出血に

医薬品

外用痔疾用薬

ヘモスト[®] 注入軟膏

使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 (2) 患部が化膿している人。

2. 長期連用しないこと

3. 授乳中の人は本剤を使用しないか、本剤を使用する場合は授乳を避けること。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
 (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 (3) 高齢者。
 (4) 本人または家族がアレルギー体質の人。
 (5) 薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 (6) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談すること

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
 その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。

(2) 10日間位使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

用法・用量

● 肛門内に注入する場合

ノズル部分を肛門内に挿入し、全量をゆっくり注入する。

年齢	1回量	1日使用回数
成人(15才以上)	1個	1~2回
15才未満	使用しないこと	

または

● 患部に塗布する場合






次の量を患部に塗布する。なお、1回塗布に使用したものは、注入には使用しないこと。

年齢	1回量	1日使用回数
成人(15才以上)	適量(1回最大量は1個とする)	1~3回
15才未満	使用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
 (2) 小児には使用させないこと。
 (3) 肛門部にのみ使用すること。
 (4) 肛門内に注入する場合、ノズル部分のみを挿入して使用すること。

注入時の痛みを少しでもやわらげるために正しくお使いください。

<p>1 キャップを静かにはずしてください。</p> 	<p>2 すべりをよくするため薬剤を少量出して先端部に塗ってください。</p> 
<p>肛門内に注入する場合</p> <p>肛門に挿入した後、容器を押してゆっくり注入し、押したままで引き抜いてください。</p>  <p>薬剤が十分に注入されるように、強く押し出してください。</p>	
<p>患部に塗布する場合</p> <p>適量を直接患部に塗るか、ガーゼなどにのぼして患部にあててください。</p>   <p style="text-align: center;">ガーゼ</p>	

※注入式のため容器の中に少量残りますが、残量を見込んで薬剤は十分充填してあります。
また、寒い時期や低温で保管した場合、多少硬くなりますが、手の中であたためると出やすくなります。

成分・分量

1個(2.5g)中

成分	分量	はたらき
酢酸ヒドロコルチゾン (副腎皮質ホルモン)	5mg	炎症、はれを抑える。
塩酸ジブカイン	7.5mg	痛み、かゆみを抑える。
塩酸エフェドリン	15mg	出血を抑える。
塩酸ジフェンヒドラミン	12.5mg	かゆみをしずめる。
酢酸トコフェロール (ビタミンE)	25mg	血行を改善し、うっ血を防ぐ。
アラントイン	20mg	傷ついた組織を修復する。

添加物として、サラシミツロウ、スクワラン、流動パラフィン、パラフィン、ワセリンを含有する。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 本剤の使用期限は外装に記載してあるので、使用期限内に使用すること。
- (5) 使用後の容器は、トイレに流さないこと。

包装

10個(2.5g×10)

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

第一製薬株式会社 お客様相談室
 〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1番8号 本社別館
 電話：03-3663-1093(ダイヤルイン)
 受付時間：月～金曜日 8:45～17:30(祝祭日を除く)

発売元



第一製薬株式会社 東京都中央区日本橋三丁目14番10号

®登録商標

製造元



株式会社 雪の元 本店 奈良県橿原市大谷町182番地