

第3類医薬品

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
必要ときに読めるように、大切に保管してください。

グロンビターEα（ビタミンE主薬製剤）

ビタミンEは、末梢の血液循環をよくして肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけの症状をやわらげます。また、のぼせなどの更年期における諸症状の緩和や、月経不順に効果をあらわします。

グロンビターEαは、ビタミンE同属体の中でも体内での効力がすぐれているアルファ型天然ビタミンE（d-α-トコフェロール）に、米胚芽油などに多く含まれているγ-オリザノールを配合し、賦形剤に小麦胚芽油を使用したソフトカプセルです。

特 長

- 血液循環促進作用をあらわすアルファ型天然ビタミンE配合
- 自律神経の調整を助けるγ-オリザノールを配合



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強がみられた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
便秘、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
- 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

効能・効果

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 更年期における次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ
- 月経不順
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」
- 次の場合のビタミンEの補給：老年期

用法・用量

次の量を服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1カプセル	2～3回 2回の場合は朝夕、3回の場合は朝昼晩
15才未満	服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守してください。

成分・分量 1日量(3カプセル)中

成 分	分 量	は た ら き
d-α-トコフェロール (アルファ型天然ビタミンE)	300 mg	末梢血液循環促進作用、ホルモン分泌調整作用などのある脂溶性ビタミンです。
γ-オリザノール	10 mg	自律神経調整作用があり、更年期における諸症状をやわらげます。

添加物：コムギ胚芽油、ゼラチン、グリセリン、D-ソルビトール、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせは

常盤薬品工業株式会社

お客さま相談室 ☎ 0120-875-710まで

受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

www.kusuribako.jp

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

☎ 0120-149-931

製造販売元

常盤薬品工業株式会社

大阪市中央区安土町3-5-12

NOEVIR GROUP