

この台紙は、服用の際にはよく読み、
大切に保管してください。

ビタミンB₁主薬製剤 キューピーコーワコンドロイザー α

△使用上の注意

■相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この台紙を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この台紙を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 軟便、下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この台紙を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

●効能・効果/1. 次の諸症状の緩和: 関節痛・筋肉痛(肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など)、神経痛、手足のしびれ、便秘、眼精疲労(慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み)

2. 脚気

「ただし、これら1・2の症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」

3. 次の場合のビタミンB₁の補給: 肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

●用法・用量/下記の量を水又は温湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠	2回
15歳未満の小児	×服用しないこと	

※食前・食後にかかわらず、いつでも服用できます。
(用法・用量に関連する注意)用法・用量を厳守してください。



台紙 : PET, PE 製造番号
成形シート : PET
キャップ : PP
ボトル : PE 使用期限
ラベル : PS

30錠

第2類医薬品

- 成分・分量(6錠中)/ボウイ乾燥エキス240.0mg(防已として3000mg)、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム900.0mg、ペンフォチアミン13.83mg[チアミン塩化物塩酸塩(V.B₁)として10.0mg]、メコバラミン(V.B₁₂)60.0 μ g、ガンマ-オリザノール10.0mg(添加物)ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、クロスカルメロースNa、ステアリン酸Mg、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、ヒプロメロース、酸化チタン、カルナウバロウ
- 保管及び取扱い上の注意/(1)高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)水分が錠剤につくと、内容成分の変化のもととなりますので、水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。誤って錠剤をぬらした場合は、ぬれた錠剤を廃棄してください。(5)容器のキャップのしめ方が不十分な場合、湿気などにより、品質に影響を与える場合がありますので、服用のつどキャップをよくしめてください。(6)ラベルの「開封年月日」記入欄に、キャップをあけた日付を記入してください。(7)使用期限(台紙及び容器に記載)をすぎた製品は服用しないでください。また、一度キャップをあけた後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安に服用してください。

お問い合わせ先 興和(株)お客様相談センター
TEL 03-3279-7755
月～金(祝日を除く)9:00～17:00

副作用被害救済制度
☎0120-149-931



4 987067 224203