

販売名:

新サロパス[®]内服液 EX

第3類医薬品

50mL×3本入

使用上の注意

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この商品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この商品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。軟便、下痢。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この商品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

●次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労 ●脚気
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師にご相談ください。」
●次の場合のビタミンB1の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

発売元 **久光製薬株式会社**

〒841-0017 鳥栖市田代大官町408

久光製薬お客様相談室：☎0120-133250

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:50（土、日、祝日を除く）

製造販売元 **東亜薬品株式会社**

〒939-3542 富山県富山市水機開発277番10

用法・用量

成人（15歳以上）1回1瓶（50mL）を1日2回服用してください。

服用間隔は4時間以上おいてください。

15歳未満は服用しないでください。

●キャップは矢印→の方向にまわして開封してください。

成分・分量（1日量100mL（2瓶）中）

チアミン硝酸塩（ビタミンB1）20mg リボフラビン（ビタミンB2）10mg ビリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）50mg ニコチン酸30mg 酢酸d-α-トコフェロール10%可溶化液（酢酸d-α-トコフェロール（ビタミンE）として100mg）1000mg オキサアミンチン末（ニンニクとして5000mg）50mg L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム200mg

添加物：中鎖脂肪酸トリグリセリド、グリセリン、ショ糖脂肪酸エステル、モノステアリン酸デカグリセリル、ポリオキシエチレン硬化ヒシ油G0、クエン酸、DL-リンゴ酸、白糖、果糖ブドウ糖液糖、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、pH調整剤、香料、エタノール、パニリン、エチルパニリン●本剤に配合されているリボフラビン（ビタミンB2）により、尿が黄色くなる場合があります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4) 使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。

第3類医薬品

肩こり・眼精疲労

新サロパス[®]内服液 EX

L-アスパラギン酸
マグネシウム・
カリウム

50mL
×3本入

Hisamitsu[®]
肩こり・眼精疲労

新サロパス[®]内服液 EX

L-アスパラギン酸
マグネシウム・
カリウム

肉体疲労時の
ビタミンB1補給

7つの有効成分配合

チアミン硝酸塩（ビタミンB1） リボフラビン（ビタミンB2） ビリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）
酢酸d-α-トコフェロール（ビタミンE） オキサアミンチン末（ニンニク）
ニコチン酸 L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム

50mL×3本入

第3類医薬品



50mL
×3本入

新サロパス[®]内服液 EX

肉体疲労時の
ビタミンB1補給

第3類医薬品

肩こり・眼精疲労

新サロパス[®]内服液 EX

使用期限

第3類医薬品

製造番号



1X14HH

01

3 060600 000203



4 987188 174135

副作用被害救済制度
☎0120-149-931