

持続型ビタミンB₁主薬製剤

リキナミン

ベンフォチアミン
ビタミンE配合

第3類医薬品

リキナミンは吸収がよくて、高い血中濃度を示す持続型ビタミンB₁誘導体ベンフォチアミンに、神経や筋肉の代謝にかかわりのあるビタミンB₂、B₆、ニコチン酸アミドを配合し、さらに、末梢血液循環改善や過酸化脂質の増加防止に用いられるビタミンEを配合したビタミン製剤です。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1)本人又は家族がアレルギー体質の人
- (2)薬によりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	悪心・嘔吐

(2)1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

軟便、下痢

効能・効果

○次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労

○脚気

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談して下さい。」

○次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15才以上）	2～3錠	1 回
11才以上15才未満	2錠	
5才以上11才未満	1錠	
5才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を守って下さい。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分・分量 1日量（3錠）中

ベンフォチアミン	138.3mg
リボフラビン（ビタミンB ₂ ）	12mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	50mg
ニコチン酸アミド	36mg
理研ドライE-S500 [トコフェロール酢酸エステル（ビタミンE酢酸エステル）15mg]	30mg

添加物として乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、炭酸Ca、タルク、ゼラチン、黄色4号（タートラジン）、サラシミツロウ、二酸化ケイ素、ケイ酸Al、セルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、白糖、酸化チタン、アラビアゴム、セラック、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、カルナウバロウを含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤に配合されているリボフラビン（ビタミンB₂）により、尿が黄色になることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4)表示の期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

中新薬業株式会社 営業部

電 話 (076)475-2121

受付時間 8:10～16:40（土、日、祝日を除く）