

この添付文書は本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください

ビタミンB<sub>1</sub>主薬製剤

第3類医薬品

## ラセージュゴールドi

ラセージュゴールドiは、体に早く吸収され、疲れた体にすぐれた効き目をあらわす活性型ビタミンB<sub>1</sub>(ベンフォチアミン)を主薬とし、神経や筋肉の働きに必要なビタミンB類、血液循環を改善するビタミンEの他に、ニンニク抽出成分(オキソアミジン末)、L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム、ガンマ-オリザノールを同時配合しております。

これらの成分が協調して働き、眼の奥の疲れ(眼精疲労)や肩こりなどの筋肉・神経の疲れなどにすぐれた効き目をあらわします。

## ⚠ 使用上の注意



## 相談すること

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
軟便、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

- 次の諸症状の緩和：眼精疲労、筋肉痛・関節痛(肩こり、腰痛、五十肩など)、神経痛、手足のしびれ、便秘
- 脚気  
「ただし、これら1・2の症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください」
- 次の場合のビタミンB<sub>1</sub>の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

## 【用法・用量】

次の量を服用してください

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2～3錠	1回
15歳未満の小児	服用しないこと	

## 〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守してください。

**【成分・分量】**

1日量(3錠)中

成 分	分 量
ベンフォチアミン [チアミン塩化物塩酸塩(ビタミンB <sub>1</sub> )として]	138.3mg (100.0mg)
オキソアミゼン末	60mg
L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム	300mg
ガンマ-オリザノール	10mg
リボフラビン(ビタミンB <sub>2</sub> )	12mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> )	50mg
シアノコバラミン(ビタミンB <sub>12</sub> )	60μg
トコフェロールコハク酸エステルカルシウム [dl-α-トコフェロールコハク酸エステル(ビタミンE)として]	51.79mg (50.0mg)

添加物：白糖、タルク、セルロース、炭酸Ca、カルメロースCa、リン酸水素Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、酸化チタン、ケイ酸Ca、アラビアゴム、ステアリン酸Mg、ゼラチン、セラック、カルナウバロウ

**〈成分・分量に関連する注意〉**

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、これはビタミンB<sub>2</sub>（リボフラビン）によるものですから心配ありません

**【保管及び取扱い上の注意】**

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)水分が錠剤につきますと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じたりすることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触らないでください。
- (5)ビンの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するために入れてありますので、キャップをあげた後は必ず捨ててください。
- (6)使用期限(外箱及びラベルに記載)をすぎた製品は服用しないでください。

本剤をご使用になられて、何かお気付きの点がございましたら、下記までご連絡頂きますようお願い致します。

**グレンツメディカル株式会社**

**TEL：0748-53-8987**

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

発売元

**グレンツメディカル株式会社**  
滋賀県蒲生郡日野町大谷東山341-32

製造販売元

**日本ビタミン化学株式会社**  
富山県富山市中大久保196-11