



ご使用前にこの添付文書を必ずお読みください。
また、必要時にそなえて大切に保管してください。

第3類医薬品

肉体疲労時のビタミンB₁補給、神経痛・筋肉痛の緩和

ネオビタミンB「クニヒロ」

ネオビタミンB「クニヒロ」は、ビタミンB₁誘導体であるフルスルチアミン塩酸塩、ビタミンB₂、ビタミンB₆、ビタミンB₁₂といったビタミンB群を4種配合した製品です。

ビタミンB群は、神経や筋肉のはたらきに重要な成分であり、またビタミンB₁₂は眼精疲労に効果があります。

肉体疲労時のビタミンB₁の補給に、また、肩こり、神経痛、筋肉痛、さらには眼精疲労などの症状に効果をあらわします。



⚠[使用上の注意]

相談すること



1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | 吐き気・嘔吐、口内炎 |

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

軟便、下痢

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

[成分]

1日量（3錠）中

- フルスルチアミン（ビタミンB₁誘導体）として…………… 100mg
（フルスルチアミン塩酸塩…………… 109.16mg）
- ビタミンB₆（ピリドキシン塩酸塩）…………… 50mg
- ビタミンB₁₂（シアノコバラミン）…………… 60μg
- ビタミンB₂（リボフラビン）…………… 12mg

添加物として、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、白糖、タルク、酸化チタン、アラビアゴム、ポビドン、カルナウバロウ、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

<成分に関連する注意>

本剤の服用により尿が黄色になることがありますが、ビタミンB₂（リボフラビン）によるものですので心配ありません。

（裏面もお読みください）

[効能・効果]

- 次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労
- 脚気
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師または薬剤師に相談してください。」
- 次の場合のビタミンB₁の補給：
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

[用法・用量]

次の1回量を食後すぐに水またはお湯でかまずに服用してください。

| 年 齢 | 1 回 量 | 1 日服用回数 |
|------------|---------|---------|
| 成人（15歳以上） | 1～3錠 | 1 回 |
| 11歳以上15歳未満 | 1～2錠 | |
| 7歳以上11歳未満 | 1 錠 | |
| 7歳未満の乳幼児 | 服用しないこと | |



<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

[保管および取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。
- (4) ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するために入れてありますので、フタをあけた後はすててください。
- (5) 箱およびビンの「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入し、ビンがこの文書とともに箱に入れたまま保管してください。
- (6) 一度開封した後は、品質保持の点から6ヵ月以内に服用してください。なお使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのご相談は、お客様相談窓口までお願い致します。

お客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-023520

受付時間 平日9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

兵庫県尼崎市長洲本通2丁目8番27号

皇漢堂製薬株式会社