

ビタミンB<sub>2</sub>主薬製剤

にきび、肌あれに

# ローランBB

LolanBB

## 皮脂が原因で起こるにきび、肌あれに ローランBBの5つのビタミン効果

**B6**活性型ビタミンB<sub>6</sub>  
(ピリドキサル  
リン酸エステル水和物)

効率的にアミノ酸代謝に関与

**C**お肌のコラーゲン生成  
を促進し肌あれに効果**B2**ビタミンB<sub>2</sub>誘導体  
(リボフラビン  
酪酸エステル)体内にとどまりお肌の  
脂質代謝にじっくりと効く**B1**ビタミンB<sub>1</sub>誘導体  
(ビスベンチアミン)お肌の代謝に必要な  
エネルギー産生を助ける**ビオチン**お肌や粘膜のトラブルに  
有効なビタミン

### ○持続型ビタミンB<sub>2</sub>を配合しています。

ローランBBに配合されているビタミンB<sub>2</sub>誘導体(リボフラビン酪酸エステル)は脂溶性で、体内にとどまり、皮脂が原因で起こるにきび、肌あれに効果的に働く持続型ビタミンB<sub>2</sub>です。

### ○活性型ビタミンB<sub>6</sub>を配合しています。

効率的に利用される活性型ビタミンB<sub>6</sub>(ピリドキサルリン酸エステル水和物)がアミノ酸の代謝に深く関与し、ビタミンB<sub>2</sub>とともにお肌のトラブルを改善していきます。

### ○ビタミンB<sub>1</sub>・ビタミンC・ビオチンも配合

その他、お肌や粘膜に必要なビタミンB<sub>1</sub>・ビタミンC・ビオチンも配合。気になるにきび、肌あれにしっかり効いていきます。

## ⚠ 使用上の注意

### ■ 相談すること

#### 1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

| 関係部位 | 症 状                    |
|------|------------------------|
| 消化器  | 胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振、悪心・嘔吐 |

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合。

#### 2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

下痢

## ■ 効能・効果

次の諸症状の緩和：

- にきび、肌あれ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ
  - 口内炎、口角炎、口唇炎、舌炎
  - 目の充血、目のかゆみ、赤鼻
- 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」

次の場合のビタミンB<sub>2</sub>の補給：

- 肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

## 〈こんなときに〉 ローランBB!

- ・にきびが気になる
- ・肌があれている



- ・なんとなく、からだがだるい

- ・口内炎が  
できている



## ■ 用法・用量

次の1回量を1日2回朝晩服用します。

| 年 齢   | 成人（15才以上） | 15才未満   |
|-------|-----------|---------|
| 1 回 量 | 1 錠       | 服用しないこと |

＜用法・用量に関連する注意＞ ○用法・用量を厳守してください。

## ■ 成 分 2錠（1日量）中

- リボフラビン酪酸エステル（ビタミンB<sub>2</sub>酪酸エステル）……………20mg
- ピリドキサルリン酸エステル水和物（活性型ビタミンB<sub>6</sub>）…24mg
- ビスベンチアミン（ビタミンB<sub>1</sub>誘導体）……………12mg
- アスコルビン酸カルシウム（ビタミンCカルシウム塩）……………100mg
- ビオチン……………50μg

添加物として、CMC、無水ケイ酸、ゼラチン、セルロース、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、D-マンニトール、アラビアゴム、カオリン、炭酸Ca、硫酸Ca、カルナウバロウ、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、バレイショデンプン、赤色2号、赤色3号、黄色5号を含有します。

○本剤配合成分のビタミンB<sub>2</sub>酪酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。

## ■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にビンのフタをよくしめて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 本剤をぬれた手で扱わないでください。ぬれた手で扱うと、糖衣にムラができたり、変色したりすることがあります。
- (5) ビンの中のつめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (6) 使用期限をすぎたものは服用しないでください。

## ■ お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-028-193

受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）

