

にきび・肌あれに

第3類医薬品

ビタミンB₂主薬製剤

プロビキューレ[®]AC錠

シオノギ製薬

にきび、肌あれなどは、過剰な皮脂分泌や肌の新陳代謝の低下が関与しています。
プロビキューレAC錠は、脂質代謝を促進する持続型のビタミンB₂誘導体を中心に、
皮ふの健康を保つビタミンB₆とビオチン、にきび・肌あれを改善する生薬ヨクイニン
を含んだのみやすい錠剤で、にきび、肌あれなどの肌トラブルを緩和して、体の内側
から肌の健康を保ちます。



使用上の注意……

相談すること



1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談下さい

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振、悪心・嘔吐

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師にご相談下さい
下痢

……効能・効果……

○次の諸症状の緩和

にきび、肌あれ、口内炎、口角炎、口唇炎、舌炎、皮ふ炎、しっしん、かぶれ、ただれ、赤鼻、
目の充血、目のかゆみ

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師
または薬剤師にご相談下さい。」

○次の場合のビタミンB₂の補給

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

……用法・用量……

次の量を食後におのみ下さい。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
15才以上	2～3錠	2 回
11才以上 15才未満	1～2錠	
7才以上 11才未満	1 錠	
7才未満	服用させないこと	

●定められた用法・用量を厳守して下さい。

●小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

……成分・分量……

プロビキューレAC錠は、白色の糖衣錠で、6錠（成人1日最大量）中に次の成分を含有しています。


成 分	含量(6錠中)
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB ₂ 誘導体)	20mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	50mg
ビオチン	21 μg
ヨクイニン末	600mg

添加物として 結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースナトリウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、タルク、アラビアゴム末、ポビドン、白糖、酸化チタン、カルナウバロウを含有しています。

- 本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるビタミンB₂誘導体が吸収利用され、その一部が尿中に排泄されるためで心配ありません。

……保管および取扱い上の注意……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管して下さい。(ビンのフタの閉め方が不十分な場合、湿気などの影響で薬が変質することがありますので、服用のつどフタをよく閉めて下さい)
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変化します)
- (4) ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防ぐためのものですから、ご使用のはじめに必ず捨てて下さい。(本剤は糖衣錠のため、落下などの衝撃で錠剤が破損することがありますので、取扱いには十分ご注意下さい)
- (5) ビンの中に乾燥剤が入っています。服用しないで下さい。
- (6) 水分が錠剤に付くと、表面の糖衣の一部が溶けて、斑点が生じることがありますので、誤って水滴をおとしたり、ぬれた手で触れないようにして下さい。
- (7) 箱の「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入して下さい。
- (8) 一度開封した後は、品質保持の点から、6ヵ月以内にご使用下さい。
- (9) 使用期限をすぎた製品は、服用しないで下さい。



……お問い合わせ先……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。

塩野義製薬株式会社「医薬情報センター」

電話:大阪 06-6209-6948, 東京 03-3406-8450

受付時間:9時～17時(土、日、祝日を除く)

「副作用被害救済制度」について

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

……包 装……

プロビキューレAC錠：90錠、180錠

®：登録商標

販売元

塩野義製薬株式会社

大阪市中央区道修町3丁目1番8号

製造販売元

至誠堂製薬株式会社

奈良県御所市茅原220-1