

ビタミンC製剤

新レモナード[®] C錠

NEW LEMONADE-C TABLETS

新レモナードC錠は、体内のさまざまな代謝系に関与しているビタミンCに加え、皮膚や粘膜の健康に欠かせないビタミンB₂を配合した黄色の錠剤です。

- しみ、日焼けなどによる色素沈着に
メラニン色素の過剰な生成を抑え、しみ、そばかす、日焼けなどによる色素沈着に効果をあらわします。
- 肉体疲労時・病中病後に
ハードな仕事・スポーツの後、妊娠・授乳期、かぜをひいている時などは、ビタミンCの需要が大幅に増大しています。新レモナードC錠は、そんな時のビタミンC補給に大変役立ちます。
- 歯ぐき、鼻からの出血予防に
細胞と細胞をつなぐ結合組織の主成分コラーゲンの生成を助けて血管を丈夫にし、出血を予防します。



⚠ 使用上の注意

🗨️ 相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

(1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
消化器	悪心・嘔吐

(2)1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合。

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

下痢

■ 効能・効果

○次の場合のビタミンCの補給：

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

○次の諸症状の緩和：

しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着

○次の場合の出血予防：

歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください」

■ 用法・用量

次の1回量を1日2～3回服用します。
ただし、1日2回服用する場合は朝晩、1日3回服用する場合は朝昼晩服用します。

年 齢	成人(15才以上)	11才～14才	5才～10才	5才未満
1回量	3錠	2錠	1錠	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■ 成 分 9錠中

ビタミンC
アスコルビン酸.....1,000mg
アスコルビン酸ナトリウム.....1,120mg
ビタミンB₂
リボフラビン.....6mg
添加物として、無水ケイ酸、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、タルク、トウモロコシデンプン、クエン酸、香料を含有します。

- 本剤の服用により、尿及び大便の検査値が影響を受けることがあります。医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを服用していることを医師にお知らせください。
○本剤配合成分のビタミンB₂により、尿が黄色になることがあります。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にビンのフタをよくしめて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)ビンの中につめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (5)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

■ お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-028-193

受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4

<http://www.ssp.co.jp/>