

## ビタミンCの補給に

第3類医薬品

ビタミンC主薬製剤

**シナルA<sup>®</sup>**カプセル

## シオノギ製薬

ビタミンCは、細胞と細胞をつなぐ結合組織の主成分コラーゲンの生成を助け、毛細血管を丈夫にしたり、皮ふのメラニン色素に働いて、しみなどの色素沈着を緩和する働きをもつ大切なビタミンです。人は、体の中でビタミンCをつくることができないため、食物または医薬品などから毎日摂取することが必要です。

シナルAカプセルは、ビタミンCとその働きを助けるビタミンB<sub>2</sub>を含んだカプセル剤で、4カプセルで2,000mgのビタミンCが補給できます。また、植物性のセルロース・カプセルを使用しています。



## 使用上の注意

## 相談すること



1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師または薬剤師にご相談下さい

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	悪心・嘔吐

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師にご相談下さい

下痢

## …… 効能・効果 ……

○次の諸症状の緩和

しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着

○次の場合の出血予防

歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師または歯科医師にご相談下さい。」

○次の場合のビタミンCの補給

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

## …… 用法・用量 ……

次の量を朝食後および夕食後におのみ下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1~2カプセル	2回
小児(7才以上15才未満)	1カプセル	2回
乳幼児(7才未満)	服用させないこと	

- 定められた用法・用量を厳守して下さい。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

## …… 成分・分量 ……

シナールAカプセルは、うすいだいだい色のカプセル剤(植物性のセルロース・カプセル)で、4カプセル(成人1日量)中に次の成分を含有しています。

成 分	含量(4カプセル中)
アスコルビン酸(ビタミンC)	2,000 mg
リボフラビン(ビタミンB <sub>2</sub> )	12 mg

添加物として トウモロコシデンプン、ステアリン酸を含有しています。またカプセル本体に酸化チタン、黄色5号、カラギーナン、含水二酸化ケイ素、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリソルベート80、ヒプロメロースを含有しています。

- (1) 本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります。これは本剤に含まれるビタミンB<sub>2</sub>が吸収利用され、その一部が尿中に排泄されるためで心配ありません。
- (2) 本剤の服用により、尿および大便の検査値に影響をおよぼすことがありますので、これらの検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせ下さい。

## …… 保管および取扱い上の注意 ……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管して下さい。(ビンのフタの閉め方が不十分な場合、湿気などの影響で薬が変質することがありますので、服用のつどフタをよく閉めて下さい)
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変化します)
- (4) 箱の「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入して下さい。
- (5) 一度開封した後は、品質保持の点から、6ヵ月以内にご使用下さい。
- (6) 使用期限をすぎた製品は、服用しないで下さい。



## …… お問い合わせ先 ……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。  
塩野義製薬株式会社「医薬情報センター」  
電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450  
受付時間：9時~17時(土、日、祝日を除く)

「副作用被害救済制度」について  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

## …… 包 装 ……

シナールAカプセル：90カプセル

Ⓢ：登録商標

製造販売元

**塩野義製薬株式会社**  
大阪市中央区道修町3丁目1番8号