

ビタミンCの補給に

ビタミンC主薬製剤
シナルS錠

シオノギ製薬

ビタミンCは、細胞と細胞をつなぐ結合組織の主成分コラーゲンの生成を助け、毛細血管を丈夫にしたり、皮膚のメラニン色素に働いて、しみなどの色素沈着を緩和する働きをもつ大切なビタミンです。人は、体の中でビタミンCをつくることができないため、食物または医薬品などから毎日摂取することが必要です。

シナルS錠は、ビタミンCを中心にビタミンCの働きを助けるビタミンB₂とビタミンEを含んだのみやすい錠剤で、ビタミンCの補給に適しています。



使用上の注意

相談すること



1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師または薬剤師にご相談下さい

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	悪 心 ・ 嘔 吐

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師にご相談下さい
下痢

…… 効能・効果 ……

○次の諸症状の緩和

しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着

○次の場合の出血予防

歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師または歯科医師にご相談下さい。」

○次の場合のビタミンCの補給

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

…… 用法・用量 ……

次の量を朝食後、昼食後および夕食後におのみ下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	2～4錠	3回
小児(7才以上15才未満)	2錠	3回
乳幼児(7才未満)	服用させないこと	

●定められた用法・用量を厳守して下さい。

●小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

…… 成分・分量 ……

シナールS錠は、芳香があり、酸味と甘味のある黄色の楕円形錠剤で、12錠(成人1日量)中に次の成分を含有しています。

成分	含量(12錠中)
アスコルビン酸(ビタミンC)	1,500 mg
リボフラビン(ビタミンB ₂)	6 mg
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	30 mg

添加物として 白糖、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、果糖、ステアリン酸マグネシウム、バニリン、プロピレングリコール、香料を含有しています。

- (1) 本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります。これは本剤に含まれるビタミンB₂が吸収利用され、その一部が尿中に排泄されるためで心配ありません。
- (2) 本剤の服用により、尿および大便の検査値に影響をおよぼすことがありますので、これらの検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせ下さい。

…… 保管および取扱い上の注意 ……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管して下さい。(ビンのフタの閉め方が不十分な場合、湿気などの影響で薬が変質することがありますので、服用のつどフタをよく閉めて下さい)
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり、品質が変化します)
- (4) ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防ぐためのものですから、ご使用のはじめに必ず捨てて下さい。(本剤は楕円形の素錠のため、落下などの衝撃で錠剤が破損することがありますので、取扱いには十分ご注意下さい)
- (5) 箱の「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入して下さい。
- (6) 一度開封した後は、品質保持の点から、6ヵ月以内にご使用下さい。
- (7) 使用期限をすぎた製品は、服用しないで下さい。



…… お問い合わせ先 ……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。
塩野義製薬株式会社「医薬情報センター」
電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450
受付時間：9時～17時(土、日、祝日を除く)

「副作用被害救済制度」について
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

…… 包 装 ……

シナールS錠：200錠、300錠

Ⓜ：登録商標

製造販売元

塩野義製薬株式会社
大阪府中央区道修町3丁目1番8号