

✂ ここからお切りください。

開封後は、湿らないようにチャックを合わせて端からしっかりと押さえてください。
服用に際して、袋の表示を必ず読むこと。

第3類医薬品

内容量180錠(30日分)

販売名:ホワイトレーザー(ビタミンC主薬製剤)

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症	状
消化器	吐き気・嘔吐	

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢

3. 1カ月位服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

- 次の諸症状の緩和/しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防/歯ぐきからの出血、鼻血
「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」
- 次の場合のビタミンCの補給/肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

用法・用量 1日2回食後服用する。

年齢	1回量
15歳以上	1～3錠
11歳以上15歳未満	1～2錠
7歳以上11歳未満	1錠
7歳未満	服用しないこと

用法・用量に関する注意

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)湿気により、錠剤表面の色が部分的に変化することがありますが、効能・効果に変わりはありません。品質保持の点からぬれた手で触れないこと。(5)乾燥剤は、最後まで捨てずに使用すること。(6)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

【お客様窓口】(商品に関するご質問・お問い合わせ)

ルソイル

☎ 0120-531-866 (午前9時～午後5時 土・日・祝日を除く)

【薬店名】

真漢方堂

【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】

(独)医薬品医療機器総合機構

☎ 0120-149-931

【発売元】

株式会社エムズサイエンス
福岡県福岡市早良区千隈3-16-1

成分・分量 成人1日量(6錠中)

アスコルビン酸(ビタミンC)…2000mg
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB₂酪酸エステル)…6mg
添加物として、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースナトリウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウムを含む。

成分に関連する注意

- (1)ビタミンB₂の一部が尿中に排泄されるため、尿が黄色くなることもある。
- (2)本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響をおよぼすことがあるため、医師の治療や検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師に知らせること。

製造番号

使用期限

【製造販売元】

ワキ製薬株式会社
奈良県北葛城郡広陵町南郷898

