

この説明書は、本剤を服用する前に必ずよくお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

2008年8月改訂

第②類医薬品

B

骨と歯の 発育不良に マイラックミンソフトα

ビタミンAD主薬製剤

特 徴

1. 本剤は健康な骨や歯を作るために必要なカルシウム、ビタミンA、ビタミンDをバランス良く配合したお薬です。さらにビタミンEを配合することで血流を改善し、健康な歯やしなやかで丈夫な骨を作るサポートを行います。
2. ラグビーボール型の小さく飲みやすいソフトカプセル剤です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 妊娠3ヵ月以内の妊婦、妊娠していると思われる人又は妊娠を希望する人

(妊娠3ヵ月前から妊娠3ヵ月までの間にビタミンAを1日10,000国際単位以上摂取した妊婦から生まれた児に先天異常の割合が上昇したとの報告があります。)

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書をもって医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	かゆみ、発疹・発赤
消 化 器	悪心・嘔吐

(2) 1ヵ月位服用しても症状の改善がみられない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

下痢、便秘

効能又は効果

- 骨歯の発育不良 ●くる病の予防 ●夜盲症（とり目）
- 次の場合のビタミンADの補給：
妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、発育期、老年期
- 次の症状の緩和：目の乾燥感

用法及び用量

次の1回量を1日1回、なるべく空腹時をさけて、水又は白湯で服用してください。

年 齢	1 回 服 用 量
成人（15歳以上）	2カプセル
15歳未満	服用しないでください

〈用法及び用量に関連する注意〉

定められた用法・用量をお守りください。

成分及び分量

2カプセル（1日量）中

成 分	含 量	働 き
乳酸カルシウム	310mg	カルシウムを補給します。
コレカルシフェロール （ビタミンD ₃ ）	400国際単位	腸からのカルシウム吸収を促進すると共に、骨から溶け出したカルシウムの骨への再沈着を助け、骨を丈夫にします。
レチノールパルミチン酸エステル （ビタミンA油）	4000国際単位	目の粘膜を保護し、乾燥感を緩和します。 光に対する視神経の感受性を高め夜盲症を改善します。
トコフェロール酢酸エステル （ビタミンE）	10mg	老年期、病中病後の体力低下時のビタミンを補給します。

※添加物として、グリセリン脂肪酸エステル、中鎖脂肪酸トリグリセリド、コハク化ゼラチン、ゼラチン、濃グリセリン、酸化チタン、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所にキャップをきちんと締めて保管してください。
- (2)水分がカプセルに付きますと内容成分の変化の原因となりますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。
- (3)お子さまの手のとどかない所に保管してください。
- (4)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (5)使用期限（外箱及び容器に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。

製品についてのお問い合わせ

- ・お買い求めの販売店
- ・ジャパンメディック株式会社 お客様相談窓口：076-438-1107
〔受付時間：月～金（祝祭日・年末年始を除く）9:00～17:00〕

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元

ジャパンメディック株式会社

富山県富山市横越168