


ハイチオールB

ビタミンB₂・B₆主薬製剤 肌と脂質の代謝を改善し、肌あれ・にきびを緩和

肌あれ・にきびに効くしくみ

==== 2つの代謝 ====

- ◎ 肌細胞の代謝を正常化
 - ◎ 脂質代謝に働く
- L-システインが肌細胞の代謝を正常化します。
 - ビタミンB₂が脂質の代謝に働き、肌あれ・にきびを改善します。
 - ビタミンB₆・ビタミンC・パントテン酸カルシウムが、肌細胞の機能維持をサポートします。



<イメージ図>

⚠ 使用上の注意



相談すること

- ① 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、胃部膨満感



- ② 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

- ③ 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

○次の諸症状の緩和

肌あれ、にきび、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、口内炎、口角炎、口唇炎、舌炎
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、
医師又は薬剤師に相談してください。」

○次の場合のビタミンB₂B₆の補給

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

次の1回量を1日2回、朝夕に水又はぬるま湯で服用してください。

年齢	成人(15才以上)	7才～14才	7才未満
1回量	2錠	1錠	×服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)食前・食後にかかわらず服用できます。
- (3)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分 4錠(成人1日量)中

L-システイン	80mg
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB ₂ 酪酸エステル)	20mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	100mg
アスコルビン酸(ビタミンC)	100mg
パントテン酸カルシウム	8mg

添加物：無水ケイ酸、セルロース、乳酸Ca、乳糖、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、炭酸Ca、カルナウパロウ、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、プルラン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール

○本剤配合成分のビタミンB₂酪酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にピンのフタをよくしめて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)本剤をぬれた手で扱わないでください。ぬれた手で扱うと、糖衣にムラができたり、変色したりすることがあります。
- (5)ピンの中につめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (6)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 ☎0120-028-193
受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)