

この添付文書は、本剤の服用前に必ずお読みください。
また、必要なとき読めるよう大切に保管してください。

H500

肌あれ、にきび、口内炎

販売名 タフィーナH500錠

ビタミンB₂B₆主薬製剤

第3類医薬品

△使用上の注意



相談すること

- 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、胃部膨満感

- 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

- 3.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

適応症

○次の諸症状の緩和：

口角炎、口唇炎、口内炎、舌炎、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、にきび、肌あれ

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」

○次の場合のビタミンB₂B₆の補給：

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

年齢ごとに次の量を、服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	2錠	1日2回朝晩、水またはお湯で、 かまずに服用してください。
7歳以上15歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないでください。	

【用法・用量に関連する注意】

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2)用法・用量を厳守してください。

成分・分量

(1日量4錠中)

ビオチン(ビタミンH).....	500 μ g	アスコルビン酸(ビタミンC).....	250mg
L-システイン.....	160mg	リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB ₂).....	20mg
ヨクイニン乾燥エキス.....	103.1mg	ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆).....	100mg
(ヨクイニン1.34gに相当)		ニコチン酸アミド.....	40mg

添加物:リン酸水素Ca、トウモロコシデンブ、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスポビドン、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、マクロゴール、酸化チタン、黄色5号、カルナウバロウ

【成分に関連する注意】

- (1) 本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、ビタミンB₂(リボフラビン酪酸エステル)によるものですから心配ありません。
- (2) 本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の診療を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせてください。
- (3) 光による変色を避けるため、箱に入れて保管してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)
- (4) 乾燥剤が入っていますが、誤って服用しないようご注意ください。
- (5) ビンの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐために入れてありますので、開封後は捨ててください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く服用してください。

 SHISEIDO

お問い合わせ先

本品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。
資生堂薬品株式会社 お客様窓口
電話 03-3573-6673
受付時間 9:30～17:00(土、日、祝日を除く)

発売元 資生堂薬品株式会社
東京都中央区銀座7-5-5

製造販売元 田村薬品工業株式会社
奈良県御所市西寺田50

H500-12063