

天然型ビタミンE・ビタミンC製剤
ビタミンB2・B6配合

第3類医薬品

バイロミンEC[®] 顆粒

肩こり、手足の冷え、しみ、そばかすなどに

バイロミンEC顆粒は、末梢循環の促進及び過酸化脂質の増加防止の働きにより、末梢血行障害による肩こりや手足の冷え、しみ、そばかすの緩和にも効果をあらわす天然型ビタミンEとメラニン色素の生成を抑制し、皮膚、結合組織などの主成分のコラーゲンの生成にも関与して、皮膚などの代謝を健全に保つビタミンCに、これらの働きを高めるビタミンB2・B6を配合した、水なしでおのみいただける冷涼感のある顆粒剤です。

⚠️【使用上の注意】



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
便秘、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師にご相談ください。」
- 次の場合のビタミンECの補給：肉体疲労時、病中病後の体力低下時、老年期



肩・首すじのこり



しみ、そばかす



手足のしびれ・冷え



日やけ・かぶれによる色素沈着

【用法・用量】

下記1回量を1日3回、朝昼晩服用します。

年齢	成人 (15歳以上)	11歳～ 14歳	7歳～ 10歳	3歳～ 6歳	1歳～ 2歳	1歳未満
1回量	1包	2/3包	1/2包	1/3包	1/4包	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法、用量を守ってください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】 1日量3包中(1包1.8g)

d- α -トコフェロール酢酸エステル(天然型ビタミンE)	300mg
アスコルビン酸(ビタミンC)	1200mg
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB ₂)	12mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	30mg

添加物としてキシリトール、還元麦芽糖水アメ、ヒドロキシプロピルセルロース、香料を含有します。

<成分・分量に関連する注意>

- (1)本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の治療を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師にお知らせください。
- (2)本剤の服用により、尿が黄色くなるがありますが、これは本剤に含まれるビタミンB₂が吸収され、その一部が尿中に排泄されるためで心配ありません。

【作用・特長】

- 血行を改善し、末梢血行障害による諸症状を緩和します。**
天然型のビタミンEが末梢血管内皮細胞の膜に作用し、血小板の凝集能や粘着能を低下させることにより、末梢循環を促進し、肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけを和らげます。
- 抗酸化性のビタミンEが体内で抗酸化作用をあらわします。**
ビタミンEは抗酸化作用を持ち、体内で過酸化脂質(体内脂肪の酸化変性物質)の増加を防止して、しみ、そばかす、末梢血行障害による肩・首すじのこりなどの緩和に効果をあらわします。また抗酸化性のビタミンCの配合によりビタミンEの抗酸化効果が増加することも知られています。
- しみ、そばかす、日やけなどによる色素沈着を緩和します。**
メラニン色素の生成機構において、ビタミンCが還元的に作用して過剰な生成・沈着を抑え、さらにビタミンB₂・B₆が協力的に働いて肌の健康を維持します。
- 血管壁を強化し出血を予防します。**
ビタミンCは結合組織において主成分であるコラーゲンの生成と維持に関与しており、血管壁を強化し歯ぐきや鼻からの出血を予防します。
- 肉体疲労時などのビタミンE Cの補給に効果的です。**
ビタミンCは肉体疲労時、病中病後などの体力消耗時にはエネルギー代謝において多量に消費されるため不足がちとなり、欠乏症を起こし易くなります。バイロミンE C顆粒にはこのビタミンCと老年期に不足しがちなビタミンEを補えるように処方しています。
- 砂糖を使用していないシュガーフリーの製剤です。**
バイロミンE C顆粒は口の中で溶けるので、水なしでも服用していただける製剤で、甘味賦形剤として冷涼感のあるキシリトールを使用しています。この成分は砂糖と異なり、血糖値の上昇及びインシュリンの分泌にほとんど影響を与えないことが知られています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさげ、品質を保持するために、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 本剤は吸湿性のため湿気にご注意ください。1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 外箱及び分包に表示の使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【包装】

1包 1.8g入り 90包

【お問い合わせ先】

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めの薬局、薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室

電話：03(3370)7174(代表)

受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

発売元 日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元 興亜製薬株式会社
横浜市港北区箕輪町2-17-5