

服用に際して、この説明文書を必ず読むこと
必要時に読めるように大切に保管すること

第3類医薬品

肉体疲労時のビタミンB₁・B₆・B₁₂の補給
肩こり、腰痛、眼精疲労に

ノイビタエース[®]

オクトチアミン配合
ビタミンB₁・B₆・B₁₂製剤

〔ノイビタエースの特徴〕

腸管からの吸収がよく、持続的にはたらくオクトチアミンとビタミンB₆・B₁₂により、神経、筋肉の機能を円滑にすることによって、肩こり、腰痛、手足のしびれ、眼精疲労、神経痛等の症状をやわらげ、肉体疲労時のビタミンの消耗を補います



〔使用上の注意〕



相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、胃部不快感、口内炎
精神神経系	頭痛

(2) 1か月位服用しても症状がよくなる場合

2. 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師または薬剤師にご相談ください

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください

軟便、下痢、便秘、顔面・皮ふの紅潮

〔効能〕

○次の諸症状の緩和：筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、眼精疲労、神経痛

「ただし、これらの症状について、1か月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師または薬剤師にご相談ください」

○次の場合のビタミンB₁ B₆ B₁₂の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

〔用法・用量〕

次の量を、水またはお湯で服用してください

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	2錠	1～2回 (2回服用の場合は朝・夕服用)
7歳～15歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないこと	

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください

〔成分・分量〕

本剤は、黄色の糖衣錠で、4錠中に次の成分を含有する

オクトチアミン(ビタミンB₁誘導体) …………… 100mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆) …………… 100mg
シアノコバラミン(ビタミンB₁₂) …………… 1500 μ g
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE酢酸エステル) …… 100mg
ニコチン酸 …………… 32mg
添加物：乳糖水和物，ケイ酸Ca，ヒドロキシプロピルスターチ，ヒドロキシプロピルセルロース，リン酸水素カルシウム水和物，メチルセルロース，CMC，タルク，ステアリン酸Mg，ヒプロメロース，マクロゴール，白糖，炭酸Ca，アラビアゴム，ゼラチン，カルナウパロウ，ビタミンB₂

〔保管および取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わる)
- (4) 水分が錠剤につくと、表面が変色したり斑点が生じることがあります。ぬれた手で触れたものを容器に戻さないでください
- (5) 容器内の詰め物は、輸送中の錠剤破損防止用ですので、開封後は捨ててください
- (6) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い致します

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8

電話 03(6667)3232

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

®登録商標



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋小網町1-8

製造販売元

大原薬品工業株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町烏居野121-15