

〔使用上の注意〕**相談すること** 1.次の場合は、直ちに服用を中止し、この瓶を持って医師又は薬剤師に相談すること(1)服用後、次の症状があらわれた場合。皮ふ：発疹 消化器：胃部不快感 (2)しばらく服用しても症状がよくなる場合。2.次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること 軟便、下痢

〔効能・効果〕○滋養強壮○肉体疲労・食欲不振・病後の体力低下・発熱性消耗性疾患・栄養障害・妊娠授乳期などの場合の栄養補給、虚弱体質

〔用法・用量〕成人(15才以上)1日1回1瓶(100mL)を服用します。

○15才未満は服用しないでください。

〔保管・取扱い上の注意〕(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管のこと。(2)小児の手の届かない所に保管のこと。(3)使用期限をすぎたものは服用しないこと。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

S.CUP^{100mL} KING

エスカップキング

滋養強壮剤

ハンピ(マムシ)チンキ・ローヤルゼリーチンキ配合

医薬品

第2類医薬品

〔成分〕1瓶(100mL)中 ハンピチンキ250mg、ローヤルゼリーチンキ300mg、イカリソウ流エキス0.1mL、ニンジン流エキス0.6mL、ビタミンE 酢酸エステル10mg、ビタミンB₁ 塩酸塩10mg、ビタミンB₂リン酸エステル5mg、ビタミンB₆5mg、ニコチン酸アミド15mg、ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン12mg、タウリン500mg、無水カフェイン50mg (アルコール1.8mL以下)

添加物として、果糖ブドウ糖液糖、アルコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、クエン酸、クエン酸Na、メタリン酸Na、安息香酸Na、パラベン、カラメル、バニリン、*l*-メントール、香料を含有します。

○ビタミンB₂リン酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。

○生薬成分配合のため、まれに濁りを生じることがあります。よく振ってから服用してください。



製造販売元

Eisai 製薬株式会社

東京都中央区日本橋浜町2-12-4
お客様相談室 ☎0120-028-193
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)
<http://www.ssp.co.jp/>

Ⓧ

0908C