

第2類医薬品

ワイビー®ゴールド液



服用前にこの説明書きを必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

第2類医薬品

ワイビー®ゴールド液

30mL×3本

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
長期連用しないで下さい

🗉 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
(1)医師の治療を受けている人 (2)高齢者 (3)むくみの症状のある人 (4)次の診断を受けた人: 心臓病、高血圧、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この商品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症状
皮膚	発疹等

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 5～6日間服用しても症状がよくなる場合
は服用を中止し、この商品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

🔥 効能効果

滋養強壮・虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

副作用救済制度 ☎0120-149-931

📏 用法用量

成人 (15才以上) 1回1本、1日1～3回服用して下さい。
服用間隔は4時間以上おいて下さい。
●用法用量を厳守して下さい。

📋 成分分量

1本 (30mL) 中
リボフラビン酸エステルナトリウム (ビタミンB2) 5mg、ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6) 15mg、ニコチン酸アミド 20mg、カルニチン塩化物 50mg、カンゾウエキス 115mg、ショウキョウ流エキス 0.3mL、ニンジン乾燥エキス 42mg、ゴウウチンキ 0.1mL、バクモンドウ流エキス 0.6mL 添加物として白糖、クエン酸、クエン酸Na、安息香酸Na、パラベンを含有します。(アルコール0.4mL以下)
●配合成分のリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがあります。

🛡 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)表示の期限内に服用して下さい。

📞 お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 ぐすり相談室
電話: (0748)88-3180 (大代表)
受付時間: 9時から17時まで (土、日、祝日を除く)

製造販売元



滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町滝879

®登録商標