

ぬれた手で錠剤にふれないでください。フタが破れていたり、はがされた形跡がある場合は使用しないでください。

この箱は本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

△ 使用上の注意 相談すること

1. 薬などによりアレルギー症状を起したことがある方は、購入時に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
2. 服用後、皮ふに発疹又は消化器に軟便・便秘等の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
3. しばらく服用しても症状の改善がみられない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

副作用被害救済制度のお問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎0120-149931

本製品についてのお問合せ先

発売元 大塚グループ **PK**
アースバイオケミカル株式会社
〒101-0048 東京都千代田区利根町2-12-1
〈お客様窓口〉☎0120-810621
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **スノーデン** 株式会社
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-16

成分及び分量 4錠(成人1日量)中

絨毛組織加水分解物……………120mg
(プラセ centa エキスとして400mg)
グルクロノラクトン……………200mg
胆汁末……………30mg
加工ダイサン末
(オキソアミンチン末)……………40mg
ピリドキシン塩酸塩
(ビタミンB6)……………10mg
ニコチン酸アミド……………30mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム
(ビタミンB2リン酸エステル)…4mg
チアミンジスルフィド……………10mg

*添加物として、セルロース、乳糖水和物、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール、カルナウバロウ、黄色4号(タートラジン)、黄色5号を含有します。●本剤に配合されているビタミンB2により、尿が黄色になることがあります。



HKAT01A

**プラセ centa
エキス配合製剤**

栄養補給
+ 疲れたときの
+ 滋養強壯

KanAce
カンエース

絨毛組織加水分解物
〈プラセ centa エキス〉

生薬成分配合

60錠

第2類医薬品 カンエース錠

OTSUKA GROUP

効能 又は 効果

- 滋養強壯 ●虚弱体質
- 肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法 及び 用量

成人(15歳以上) 1回2錠を1日2回服用してください。15歳未満は服用しないでください。●用法・用量を厳守してください。

〈 保管及び取扱い上の注意 〉

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- 品質保持の為、錠剤はぬれた手で扱わないでください。
- 容器内の詰め物は、輸送中の錠剤保護用です。開封後は捨ててください。
- 容器落下等による錠剤破損防止の為、この箱に入れて保管する等、取扱いにご注意ください。
- 容器内の乾燥剤は食べられません。
- 使用期限、製造番号はこの箱の底面に記載しています。

使用期限

製造番号

ABCD
1234