

発熱性消耗性疾患時の
栄養補給、滋養強壮に

ハイアンプル E-E内服液

Hai Ampoule
ACE
ORAL SOLUTION

第2類医薬品

発売元 30mL
E-E製薬株式会社
東京都中央区日本橋浜町2-12-4
お客様相談室 0120-028-193
受付時間9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

〔成分〕1瓶(30mL)中
ケイヒ抽出液1,000mg、ニンジン
抽出液1,500mg、タイソウ抽出液
600mg、カンソウ抽出液1,600mg、
セイヨウサンザシエキス10mg、イ
カリソウ流エキス0.15mL、シベッ
トチンキ0.02mL、ビタミンB₁塩酸
塩10mg、ビタミンB₂リン酸エステ
ル5mg、ビタミンB₆5mg、ニコチン
酸アミド10mg、カルニチン塩化物
50mg、タウリン500mg
(アルコール0.7mL以下)

添加物として、D-ソルビトール、
白糖、アルコール、プロピレング
リコール、クエン酸、クエン酸Na、
安息香酸Na、パラベン、カラメル、
L-グルタミン酸Na、香料を含有
します。

○ビタミンB₂リン酸エステルに
より、尿が黄色になることがあ
る。

○生薬成分配合のため、まれに濁
りを生じることがある。よく振
って服用のこと。

〔効能・効果〕発熱性消耗
性疾患・病中病後・食欲不
振・肉体疲労・栄養障害・妊
娠授乳期などの場合の栄養
補給、滋養強壮、虚弱体質

〔用法・用量〕成人(15才以上)1回
1瓶(30mL)を1日2回服用します。
〔使用上の注意〕

相談すること 1. 次の場合は、
直ちに服用を中止し、この瓶を
持って医師又は薬剤師に相談す
ること (1) 服用後、次の症状が
あらわれた場合。皮ふ：発疹、消
化器：胃部不快感 (2) しばらく服
用しても症状がよくなる場合。
2. 次の症状があらわれることが
あるので、このような症状の継
続又は増強がみられた場合には、
服用を中止し、医師又は薬剤師
に相談すること 軟便、下痢
〔保管・取扱い上の注意〕(1) 直
射日光の当たらない涼しい所に
保管のこと。(2) 小児の手の届か
ない所に保管のこと。(3) 使用期
限をすぎたものは服用しないこと。

製造販売元 同仁医薬化工株式会社
東京都中野区弥生町5-2-2
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

J1