

販売名：トッカピンキング

【使用上の注意】

【相談すること】

しばらく服用しても症状がよくなり  
ない場合は服用を中止し、この製  
品を持って医師、薬剤師又は登  
録販売者に相談すること

【効能・効果】

●滋養強壮 ●虚弱体質 ●肉  
体疲労、病中病後、食欲不振、  
栄養障害、発熱性消耗性疾患、  
産前産後などの場合の栄養補給。

【用法・用量】

大人(15才以上) 1日1回1ビン(50mL)  
を服用する。

・用法及び用量を厳守すること。

滋養強壮、虚弱体質

トッカピンキング

TOKKAPIN



【成分・分量】1日量(1ビン:50mL)  
ニンジンエキス …………… 55mg  
(日局ニンジン605mgに相当)  
ゴオウチンキ …………… 200μL  
(日局ゴオウ2mgに相当)  
シベットチンキ …………… 20μL  
(シベット1mgに相当)  
トチュウ抽出液 …………… 100μL  
(日局トチュウ100mgに相当)  
イカリソウエキス …………… 30mg  
(日局インヨウカク300mgに相当)  
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム 300mg  
酢酸α-トコフェロール(ビタミンE) 10mg  
チアミン塩化物硫酸塩(ビタミンB1) 10mg  
リボフラビン(ビタミンB2) …… 2mg  
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6) 5mg  
ニコチン酸アミド …………… 20mg  
無水カフェイン …………… 50mg

(アルコール含有0.5mL以下)  
添加物としてクエン酸、DL-リンゴ酸、  
白糖、ブドウ糖果糖液糖、D-ソルビト  
ール、安息香酸Na、パラベン、プロ  
ピレングリコール、ポリオキシエチ  
レン硬化ヒマシ油、エデト酸カルシ  
ウム二ナトリウム、香料、アルコール、  
グリセリン、パニリンを含有します。

・本剤に配合されているリボフラビンに  
より、尿が黄色になることがあります。  
・生薬成分を含むため、まれに沈澱を  
生じることがありますが、薬効には支  
障ありません。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所  
に保管すること。(2) 小児の手の届か  
ない所に保管すること。(3) 他の容器  
に入れ替えないこと(誤用の原因にな  
ったり品質が変わる。)(4) 使用期限  
の過ぎた製品は服用しないこと。

製造販売元 **Kinyo** 金陽製薬株式会社  
奈良県五條市住川町1420番地  
TEL 0747-22-3451

50mL 第2類医薬品

ガラス：ビン  
金属：キャップ

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

使用期限

Lot No.

ニンジン 605mg(原生薬換算量)

インヨウカク 300mg(原生薬換算量)

コンドロイチン 300mg