

〔成分・分量〕

1日量(1本:30mL)中
 ニンジンエキス(人参)40.3
 mg(ニンジン600mgに相
 当)、ゴオウチンキ(牛黄)0.2
 mL(ゴオウ2mgに相当)、ロ
 クジョウチンキ(鹿茸)0.1mL
 (ロクジョウ30mgに相当)、
 チアミン塩化物10mg、リポ
 フラビリン酸エステルナ
 トリウム5mg、ピリドキシン塩
 酸塩6mg、ニコチン酸アミド
 20mg、無水カフェイン50
 mg(アルコール含有0.2mL
 以下)添加物としてクエン酸、
 DL-リンゴ酸、バチミツ液糖、
 D-ソルビトール、L-グルタミン
 酸Na、安息香酸Na、香料、
 アルコール、プロピレングリ
 コール、グリセリン、パニリ
 ン、エチルパニリン、ビタミ
 ンEを含有します。

・本剤に配合されているリ
 ポフラビリン酸エステル
 ナトリウムにより、尿が黄
 色になることがあります。
 ・生薬成分を含むため、ま
 れに沈澱を生じることが
 ありますが、薬効には支
 障ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない
 涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所
 に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えな
 いこと(誤用の原因になっ
 たり品質が変わる。)
- (4) 使用期限の過ぎた製品
 は服用しないこと。

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

ゴオウ・ニンジン ロクジョウ

30mL

滋養強壮、肉体疲労時の
栄養補給

リポケンコー 内服液Ⅱ

第3類医薬品

販売名：リポケンコー内服液Ⅱ

〔使用上の注意〕

〔相談すること〕

しばらく服用しても症状がよくならない
 場合は服用を中止し、この製品を持って
 医師、薬剤師又は登録販売者に相談す
 ること

〔効能・効果〕

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病
 後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性
 疾患・産前産後などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

成人(15歳以上)1日1回1本(30mL)
 を服用する。

- ・用法及び用量を厳守すること。
- ・内服にのみ使用すること。

111760
FSI201

Rinpo

製造販売元

金陽製薬株式会社

東京都五枚市在川町1420番地
 TEL 0747-22-3451



アンプル：PP
 ラベル：PET

使用
期限

Lot
No.