

KAIGEN

reviroyal

発熱・疲労時の 栄養補給に



第2類医薬品

レビローヤル 内服液

【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】 大人(15歳以上) 1回1本(30mL)を1日3回服用してください。

●用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】 1日量(90mL)中

リボフラビン・・・・・・・・・・ 6mg

ピリドキシン塩酸塩・・・・・・・・ 30mg

タウリン・・・・・・・・・・・・・・ 1800mg

ゴオウチンキ(原生薬3mg)・・・・ 300μL

バクモンドウ流エキス(原生薬300mg)・・ 300μL

カンゾウエキス(原生薬5000mg)・・・・ 1666.5mg

添加物:ブドウ糖果糖液糖、白糖、D-ソルビトール、クエン酸、クエン酸Na、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、カラメル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、香料(アルコール0.9mL以下)

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。(4)生薬成分を配合しているため、まれに沈殿が生じることがありますが、薬効には影響ありません。よく振ってから服用してください。

発売元 **カイゲンファーマ株式会社**
大阪府中央区道修町二丁目5番14号
お客様相談室 ☎06-6202-8911
受付9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **萬金薬品工業株式会社**
奈良県高市郡明日香村野口317

—【△使用上の注意】—

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります) 長期連用しないでください

相談すること

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)高齢者。
- (3)次の症状のある人。むくみ
- (4)次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、腎臓病

2.服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師の診療を受けてください

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3.5~6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

副作用被害救済制度

☎0120-149-931