

販売名：
ロスミンK内服液

第3類医薬品

【用法・用量】

成人(15歳以上)1回1びん(30mL)を1日2回服用してください。

●定められた用法・用量を厳守してください。

【効能・効果】

●肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性
消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

●虚弱体質

●滋養強壮

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手のとどかない所に保管してください。

(3)他の容器に入れかえないでください。

(誤用の原因になったり品質が変わります)

(4)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

米田薬品株式会社

大阪市浪速区塩草3丁目2-2

お客様相談窓口 電話 06-6562-7411

受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



発熱性
消耗性疾患時・
胃腸障害時
の栄養補給



ロスミンK【内服液】

第3類医薬品

30mL×6

発熱性
消耗性疾患時・
胃腸障害時
の栄養補給

ロズニク

【内服液】

第3類医薬品

30mL×6

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
長期連用しないでください。

☎ 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 高齢者。(3) 次の症状のある人。むくみ
(4) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、このパッケージを持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。偽アルドステロン症(尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる)(2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合。

【成分・分量】 1びん(30mL)中

カンゾウエキス	500mg
(原生薬換算量 2,500mg)	
紅参(コウジン)乾燥エキス	30mg
(原生薬換算量 300mg)	
塩酸チアミン(ビタミンB ₁)	10mg
塩酸ピリドキシン(ビタミンB ₆)	25mg
アミノエチルスルホン酸	1,000mg
添加物: ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸、パラベン、香料、クエン酸、エタノール、黒砂糖、白糖、β-シクロデキストリン	

<成分・分量に関連する注意>

生薬成分を配合しているため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には影響ありませんので、よく振ってから服用してください。

使用期限 / LOT NO.