

発熱性消耗性疾患時の栄養補給

スーパーリル・ブルー

第3類医薬品

製造番号

使用期限

滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給

スーパーリル[®]
ブルー

30mL×5



第3類医薬品

タウリン・ゴオウ・薬用人参配合

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)

滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給

スーパージェル・ブルー®

第3類医薬品

成分・分量
1本(30mL)中

タウリン 600mg
ニンジンエキス(原生薬換算333.3mg) 50mg
ゴウモウ浸出液(原生薬換算1mg) 1,000mg
チアミン塩化物塩酸塩(V.B1) 5mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム(V.B2) 4mg
アスコルビン酸(V.C) 100mg

パンテノール 10mg
イノシトール 100mg
重酒石酸コリン 100mg
グルクロノラクトン 100mg
ガラナ流エキス(原生薬換算100mg) 100mg
カフェイン水和物 15mg

添加物としてL-グルタミン酸Na、クエン酸、白糖、コハク酸2Na、dl-リンゴ酸、D-ソルビトール液、バラベン、安息香酸、安息香酸Na、香料、エタノール、プロピレングリコール、グリセリン脂肪酸エステルを含有する。

用法・用量
効能・効果

成人(15才以上)1回1本(30mL)、1日3回食後に服用してください。
滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・
発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

使用上の注意

相談すること 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 皮膚：発疹／消化器：胃部不快感、下痢
2.しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

取扱い上の注意

1.小児の手のとどかない所に保管してください。
2.直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
まれに沈殿(生薬による)を生じることがありますが、
薬効には変わりありません。
ビタミンB₂が配合されていますので、尿が黄色くなることがあります。



発売元
日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16
お客様相談室 03-3370-7174(代表)
<http://www.nippo-yakuhin.jp/>



製造販売元
福井製薬株式会社
大阪市城東区今福東3丁目1番26号