

L-システイン製剤


ハイチオールC[®]

HYTHIOL-C

ハイチオールCは、L-システインを240mg（成人1日量）配合しています。

☆L-システイン（アミノ酸）は…

L-システインはタンパク質を構成するアミノ酸の一つです。皮膚や肝臓に多く存在し、種々の代謝に関与することで、からだの健康に重要なはたらきをしています。



★気になるシミ・そばかすに

L-システインが、シミのもと（過剰にできるメラニン）の生成をおさえ、ビタミンCとともにシミ治療にすぐれた効果をあらわします。



★からだ全体がなんとなくだるい時に

エネルギー産生に関与するL-システインが、全身倦怠を改善していきます。



★つらい二日酔いに

L-システインが、二日酔いの原因物質の代謝分解をたすけ、不快な症状を改善していきます。



★湿疹、かぶれに

お肌にも多く含まれているL-システインが、お肌の健康に必要なビタミンC、パントテン酸とともに、湿疹やかぶれの改善に効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意

🗨️ 相談すること

1. 次の場合は直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	悪心・嘔吐、腹痛

(2) しばらく服用しても症状がよくなる場合。

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

下痢

■ 効能・効果

- しみ・そばかす・日焼けなどの色素沈着症
- 全身倦怠
- 二日酔
- にきび、湿疹、じんましん、かぶれ、くすりまけ

■ 用法・用量

次の1回量を1日3回*服用します。

年 齢	成人(15才以上)	7才~14才	7才未満
1回量	2錠	1錠	服用しないこと

* (食前または食後に、水またはお湯で服用してください。)

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)食前・食後、いずれの服用でもかまいません。
- (3)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■ 成 分 6錠(成人1日量)中

L-システイン240mg
アスコルビン酸(ビタミンC)300mg
パントテン酸カルシウム24mg
添加物として、無水ケイ酸、セルロース、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、炭酸Ca、カルナウバロウ、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、部分アルファー化デンプン、プルラン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールを含有します。

●本剤の服用により、尿及び大便の検査値が影響を受けることがあります。医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを服用していることを医師にお知らせください。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にビンのフタをよくしめて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)本剤をぬれた手で扱わないでください。ぬれた手で扱っていると、糖衣にムラができたり、変色したりすることがあります。
- (5)ビンの中につめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (6)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

■ お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-028-193

受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

