

ハイチオールCドリンク 第3類医薬品

〔成分〕1瓶(50mL)中

ビタミンC 1000mg、ビタミンB₂リン酸
エステル6mg、ビタミンB₆ 25mg、パン
テノール15mg、ニコチン酸アミド 20mg

添加物として、白糖、アルコール、クエン
酸Na、メタリン酸Na、安息香酸Na、パ
ラベン、カラメル、香料を含有します。

○本剤の服用により、尿及び大便の検査
値が影響を受けることがあります。医師の
検査を受ける場合は、ビタミンCを服用
していることを医師にお知らせください。

〔効能・効果〕

○次の諸症状の緩和しみ、そばかす、日やけ
・かぶれによる色素沈着○次の場合の出血
予防：歯ぐきからの出血、鼻出血「ただし、
これらの症状について、1ヵ月ほど使用
しても改善がみられない場合は、医師、
薬剤師又は歯科医師に相談してください」
○次の場合のビタミンCの補給：肉
体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体
力低下時、老年期

〔用法・用量〕

成人(15才以上)1回1瓶(50mL)を1日
1~2回服用します。ただし、2回服用する
場合は朝晩服用します。○15才未満は服
用しないでください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元：エスエス製薬株式会社
東京都中央区日本橋浜町2-12-4

お客様相談室：☎0120-028-193


受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

<http://www.ssp.co.jp/>

気になる
シミ・そばかすに

ハイチオールC ドリンク

〔ビタミンC主薬製剤〕



 エスエス製薬

第3類
医薬品

●服用の際には、必ずお読みください。

〔使用上の注意〕相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この
瓶を持って医師、歯科医師又は薬剤師に
相談すること(1)服用後、次の症状があら
われた場合。皮膚：発疹 消化器：胃部不快
感、悪心・嘔吐(2)1ヵ月位服用しても症状
がよくなる場合。2. 次の症状があらわ
れることがあるので、このような症状の継
続又は増強がみられた場合には、服用を
中止し、医師又は薬剤師に相談すること
軟便、下痢

〔保管・取扱い上
の注意〕(1)直射
日光の当たらない涼しい所に保
管のこと。(2)小
児の手の届か
ない所に保管
のこと。(3)使用
期限をすぎたも
のは服用しない
こと。

50mL

0708C (J1)

C08HA
040801A