

この説明書は本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

第2類医薬品

しょうみやくほう

滋養強壯剤

生脈宝エキス細粒

生脈宝エキス細粒は、中国の医書「医学啓源」（1186年）に記載されている“生脈散”（人參，麥門冬，五味子）を基本とし、党参を加味した滋養強壯剤です。
肉體疲労時や胃弱、食欲が出ない時に、また、冷房等の冷えによく奏効します。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の人は服用しないでください。

熱のある人



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わるため。）
- 本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- スティック包装を開封後はすみやかに服用してください。なお、残りを使用する場合は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

発売元 株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談窓口

TEL 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30（土・日・祝日を除く）

効能・効果

次の場合の滋養強壯：

虚弱体質、肉體疲労、病中病後、胃腸虚弱、食欲不振、血色不良、冷え症、発育期

用法・用量

次の量を食前又は食間に服用してください。

（食間とは食後2～3時間を指します。）

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15才以上）	1包	3回
15才未満8才以上	2/3包	
8才未満	服用しないでください	

〔用法・用量に関連する注意〕

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

本品3包（6.0g）中

ニンジンエキスM 450mg

（人參3,015mgに相当）

バクモンドウ乾燥エキス ... 660mg

（麥門冬1,980mgに相当）

ゴミシエキスJ 210mg

（五味子1,176mgに相当）

トウジン流エキス 0.5mL

（党参500mgに相当）

添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、乳糖水和物、パレイシヨデンブンを含有します。

発売元

 株式会社ウチダ和漢薬

東京都荒川区東日暮里4-4-10

製造販売元

松浦薬業株式会社

名古屋市緑区大高町寅新田36